

执业医师考试模拟试题及解析：内分泌（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/250/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_250252.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_250252.htm) 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 抗甲状腺药物丙基硫氧嘧啶、他巴唑最严重的不良反应是 A.永久性甲低 B.药疹 C.胃肠道反应 D.肝功能损害 E.粒细胞缺乏 答案：E 题解：药物的不良反应主要是粒细胞减少或粒细胞缺乏，如WBC低于 $3 \times 10^9 / L$ 或中性粒细胞低

于 $1.5 \times 10^9 / L$ 时，应停药处理。粒细胞缺乏症常在数天内突然发生，需立即停药、住院治疗。需注意区分粒细胞减少是甲亢本身引起，还是由抗甲状腺药物引起。

2. 甲状腺危象时，首先选用的药物是 A.心得安 B.甲基硫氧嘧啶 C.丙基硫氧嘧啶 D.碘化钠静脉滴注 E.氢化可的松静脉滴注 答案：C

题解：当临床上怀疑有危象时，应立即口服PTU 600mg，以后150~200mg每日3次。心得安、利血平可降低周围组织对甲状腺素反应，其他支持治疗包括吸氧，物理降温、纠正水电解质紊乱、抗感染，监护心肾功能和血压，躁动不安时加用镇静剂。肾上腺皮质激素可加强应急反应能力。

3. 可引起继发性腺垂体功能减退症的是 A.垂体大腺瘤 B.席汉

(Sheehan)综合征 C.真菌性垂体脓肿 D.垂体卒中 E.外伤性垂体柄断裂 答案：E 题解：继发性腺垂体功能减退症的主要病因有：

垂体柄损伤：如外伤、垂体或蝶鞍区手术、肿瘤压迫等；下丘脑及其他中枢神经系统病变：如创伤、肿瘤、结节病及组织细胞病、神经性厌食、中毒（长春新碱等）等

- 。 4. 腺垂体功能减退症最常见的病因是 A.颅内感染 B.颅脑外伤 C.产后大出血 D.垂体或邻近的肿瘤 E.下丘脑病变 答案：D 题解：垂体瘤是成人腺垂体功能减退症最常见的病因。垂体瘤可分为功能性和无功能性两种，腺瘤增大可压迫正常垂体组织，使其功能减退，或功能减退与亢进合并存在。
5. 垂体功能减退症最早出现的靶腺功能减退是 A.肾上腺皮质功能减退 B.性腺功能减退 C.甲状腺功能减退 D.肾上腺与甲状腺功能减退 E.甲状腺与性腺功能减退 答案：B 题解：腺垂体功能减退临床表现为垂体的靶腺即性腺、甲状腺和肾上腺皮质继发性功能减退。女性闭经、不育，男性性欲减退或阳痿，女性第二性征减退等性腺功能减退的症状出现最早、最普遍。
6. 以下哪项不符合甲亢的临床表现 A.易发生房性心律失常 B.可发生低钾性麻痹 C.活动时心率加快，休息则心率正常 D.可伴有肌病 E.老年患者可不出现高代谢症候群 答案：C 题解：甲亢主要表现有怕热、多汗、易饿、多食而消瘦、疲乏无力；兴奋、多语、易激动，双手、上眼睑、伸舌有细颤，腱反射活跃；心率增快（静息时心率仍快）、心音强烈、心律紊乱、心脏增大、心力衰竭；收缩压增高而舒张压偏低、脉压差增大；肠蠕动加快、大便不成形、次数多或腹泻；肌无力、肌萎缩和慢性甲亢肌病，可发生低钾性麻痹；月经紊乱，经量减少，不易受孕等。老年患者可不出现高代谢症候群。
7. 14岁初中二年级女学生，Graves病，治疗宜选用 A.<sup>131</sup>I治疗 B.抗甲状腺药物 C.镇静剂 D.立即手术治疗 E.鼓励多食海带 答案：B 题解：药物治疗适用甲状腺较小，病情中度以下、甲亢初治、年龄较小、不宜手术和孕期甲亢；甲亢伴有较严重突眼；甲状腺手术前准备和甲状腺次全

切除后甲亢复发者；I131治疗甲亢前后作辅助治疗等。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)