

执业医师考试模拟试题及解析：循环系统（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_250264.htm 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 哪个部位的急性心肌梗死最易发生房室传导阻滞

A.前壁心肌梗死 B.后壁心肌梗死 C.侧壁心肌梗死 D.下壁心肌梗死 E.左房心肌梗死 答案：D 题解：下壁心肌梗死累及房室结、房室束等心传导系统，易发生房室传导阻滞。

2. 诊断变异型心绞痛，下述哪项是错误的 A.安静时可以发病 B.发作时心电图ST段明显压低 C.每天可在同一时间发病 D.疼痛时间延长 E.发作时可有室性早搏 答案：B 题解：变异型心绞痛发作时有短暂的ST段抬高的特异性心电图变化。除B项外，其余各项均是变异型心绞痛的临床特点。

3. 女性，78岁，因剧烈心前区疼痛6小时不缓解，急诊心电图提示广泛前壁心肌梗死。查体：BP 100 / 60mmHg，呼吸急促，30次 / 分，口唇发绀，双肺底闻及细小水泡音，心率120次 / 分，心尖区第一心音减弱，可闻及舒张期奔马律。最可能的诊断是

A.急性广泛前壁心梗合并肺部感染 B.急性广泛前壁心梗合并心律失常 C.急性广泛前壁心梗合并心力衰竭 D.急性广泛前壁心梗合并心源性休克 E.急性广泛前壁心梗合并肺栓塞 答案：C

题解：急性心肌梗死后可有急性左心衰竭，在病初几天内发生，或可在疼痛、休克好转时出现，系心肌收缩力显著减弱或心肌收缩不协调所致。

4. 多数急性心肌梗死患者最早出现和最突出的症状是 A.剧烈而持久的胸骨后疼痛 B.心力衰竭

C.心律失常 D.休克 E.晕厥 答案：A 题解：急性心肌梗死患者最早出现和最突出的症状是剧烈而持久的胸骨后疼痛。

C.胃肠道反应 D.心源性休克 E.发热 答案：A 题解：胸骨后疼痛是最先出现和最突出的主要症状。其部位和性质与心绞痛相同，但常发生于安静或睡眠时，疼痛较重，持续时间可达数小时或数天，休息或含服硝酸甘油多不能缓解。 5.

心肌梗死急性期病人，一旦出现室性期前收缩，应首选 A.普萘洛尔 B.维拉帕米 C.利多卡因 D.地西泮（安定） E.苯妥英钠

答案：C 题解：一旦出现室性早搏，立即静脉推注利多卡

因50~100mg. 6. 女，58岁，近半年来自觉心前区阵发性

疼痛，常在休息或清晨时发作，持续时间15分钟，含服硝酸甘油后缓解，疼痛发作时，心电图胸前导联ST段抬高，运动

负荷试验阴性，其诊断为 A.初发型心绞痛 B.卧位型心绞痛 C.稳定型心绞痛 D.变异型心绞痛 E.恶化型心绞痛 答案：D 题解

：变异型心绞痛：通常在昼夜某一固定时间自发性发作心前区疼痛，发作时心电图示有关导联ST段抬高及相对应导联ST段压低，常伴有严重心律失常或房室传导阻滞。为冠状动脉突然痉挛所致，患者迟早发生ST段抬高部位的心肌梗死。 7.

下列哪项不是心肌梗死的并发症 A.心脏破裂 B.梗死后综合征 C.主动脉窦瘤破裂 D.心室壁瘤 E.二尖瓣脱垂 答案：C

题解：心肌梗死后可并发乳头肌功能失调、心室壁瘤、栓塞、心脏破裂、心肌梗死后综合征等并发症。 8. 下列哪

一项不是我国冠心病主要的易患因素 A.高血压病 B.甲状腺功能低下 C.吸烟 D.高脂血症 E.肥胖 答案：B 题解：除甲状腺功能低下外，其余各项均是冠心病的主要危险因素。 9. 下列

哪一种药物最常应用于治疗冠心病变异型心绞痛发作 A. 受体阻滞剂 B. 受体阻滞剂 C.钙通道阻滞剂 D.硝酸酯类 E.血管

紧张素转换酶抑制剂 答案：C 题解：钙通道阻滞剂可解除冠

状动脉痉挛，抗血小板凝聚，改善冠脉供血和微循环灌注，治疗变异型心绞痛首选。 10. 急性心梗死时血清酶中升高最早的是 A.AST B.肌红蛋白 C.LDH D.CPK-MB E.cTnT 答案：B
题解：肌红蛋白在梗死后升高最早，也十分敏感，但特异性不强。CPK-MB、cTnT升高稍迟，但特异性较强。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com