

执业医师考试模拟试题及解析：循环系统（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_250265.htm 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 男性，55岁，血压180 / 110mmHg，服降压药后血压控制在130-140 / 80-90mmHg，心电图示左室肥厚，眼底视网膜动脉变窄，尿蛋白微量，该例最可能的诊断是 A.高血压病I期 B.高血压病 期 C.高血压病 期 D.肾动脉狭窄 E.慢性肾小球肾炎

答案：B 题解：二期高血压：至少有一项器官损害表现：左心室肥厚（X线、心电图、超声）；视网膜动脉变窄；蛋白尿和（或）血肌酐轻度升高（106 ~ 177 $\mu\text{mol/L}$ ）；超声或X线示有动脉硬化斑块（颈、主、髂、股动脉）。

2. 以下哪种疾病最适合 受体阻滞剂治疗 A.高血压伴心功能不全 B.高血压伴肾功能不全 C.高血压伴支气管哮喘 D.高血压伴心动过缓 E.高血压伴肥厚梗阻性心肌病

答案：E 题解：受体阻滞剂在心肾功能不全、支气管哮喘、心动过缓时应谨慎使用，对于肥厚梗阻性心肌病，受体阻滞剂可迟缓肥厚心肌，防止心动过速，维持正常的窦性心律。

3. 下列哪项不是感染性心内膜炎的临床表现 A.皮肤黏膜淤点 B.颜面部蝶形红斑 C.脾肿大 D.贫血 E.杵状指

答案：B 题解：感染性心内膜炎可出现皮肤黏膜瘀点、脾肿大、贫血、杵状指等症状，颜面部蝶形红斑是系统性红斑狼疮的体征之一。

4. 感染性心内膜炎的治疗，下列哪项是不正确的 A.早期应用抗生素 B.足量应用抗生素 C.宜选用杀菌性药物

D. 抗生素至少用4~6周 E. 等待血培养及药敏结果报告后，方可用药 答案：E 题解：感染性心内膜炎应用抗生素时应遵循下列原则：早期治疗；选用有效的杀菌剂；剂量足、疗程长；联合用两种或两种以上抗生素。可在连续抽取几次血培养后即开始用药，不必等待结果出来后开始治疗。 5.

高血压伴肾功能衰竭、高血钾时，选用下列哪类药物应慎重 A. 氢氯噻嗪利尿剂 B. 心痛定缓释片，钙拮抗剂 C. 倍他乐克，受体阻滞剂 D. 卡托普利，ACEI类药物 E. 受体阻滞剂，哌唑嗪 答案：D 题解：ACEI类药物在严重肾功能损害（血肌酐 $> 265.5 \mu\text{mol/L}$ ）、高血钾时应慎重使用。 6.

应用降压药治疗高血压病，下列原则中哪一条是错误的 A. 血压显著增高已多年的病人，应尽快使血压降至正常水平 B. 单个药物小剂量开始，逐渐加量，必要时可联合用药 C. 血压下降并稳定正常后。改为维持量长期用药 D. 坚持个体化用药 E. 发生高血压危象时要紧急降压 答案：A 题解：血压长时间处于较高水平的患者，不可过于迅速降压。 7.

高血压病者服用降压药物治疗，降压目标是 A. 血压降至正常范围，即年轻者血压控制在 $120 \sim 130/80\text{mmHg}$ ，老年人可降至 $140/90\text{mmHg}$ 以 B. 降至临界高血压水平，即 $140 \sim 160/90 \sim 95\text{mmHg}$ C. 收缩压控制在 160mmHg ，舒张压控制在 85mmHg D. 血压控制在病人可耐受的程度 E. 以上都不是 答案：A 题解：年轻高血压患者的目标血压控制水平应较老年患者更低。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com