

执业医师考试模拟试题及解析：循环系统（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_250282.htm 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪种症状、体征在右心衰时不常出现 A.劳累性呼吸困难 B.腹胀、食欲不振、恶心、呕吐 C.粉红色泡沫状痰 D.水肿 E.肝脏肿大 答案：C 题解：腹胀、食欲不振、恶心、呕吐、水肿、肝脏肿大及劳累性呼吸困难在右心衰时均较常见，而咳粉红色泡沫状痰是左心衰急性肺水肿时的特征性症状。

2. 鉴别右心衰竭与肝硬化的要点是 A.下肢水肿 B.肝脏肿大 C.肝颈静脉回流征阳性 D.食欲减退。恶心。呕吐 E.腹水形成 答案：C 题解：食欲减退、恶心、呕吐、下肢水肿、肝脏肿大和腹水形成在右心衰竭与肝硬化时均可出现。肝颈静脉回流征阳性是右心衰的特征性体征。

3. 洋地黄中毒多见的心律失常是 A.室上性心动过速 B.室性早搏二联律 C.心房纤颤 D.房室传导阻滞 E.房性早搏 答案：B 题解：室性早搏是洋地黄中毒常见的心律失常，以频发多源性室性早搏呈二联律最常见。

4. 下列哪项不是引起左心衰竭的常见原因 A.高血压病 B.慢性肺部疾病 C.心肌梗死 D.主动脉瓣关闭不全 E.二尖瓣关闭不全 答案：B 题解：左心衰竭的常见原因有左心室压力负荷过重如高血压、主动脉瓣狭窄；心室容量负荷过重如主动脉瓣关闭不全、二尖瓣关闭不全；心肌收缩力减低如冠心病等。而慢性肺部疾病主要引起右心室压力负荷增加，导致右心衰竭。

5. 男，60岁。高血压患者，突然

心悸。气促，咳粉红色泡沫痰。查体：血压26.6 / 15.96kPa (200 / 120mmHg)，心率136次 / 分。除其他治疗外，还应选用下列哪组药物 A.西地兰、硝酸甘油、异丙肾上腺素 B.毒毛旋花子苷K、硝普钠、心得安 C.胍乙啶、酚妥拉明、西地兰 D.硝普钠、西地兰、速尿 E.硝酸甘油、西地兰、多巴胺

答案：D 题解：严重高血压导致急性心衰肺水肿发作时，降压、扩张动静脉、强心、利尿是较好的治疗方案。

6. 心力衰竭诱发因素中一般最常见的为 A.有效循环血容量增加 B.心律失常 C.过度劳累或情绪激动 D.严重贫血或大出血 E.感染

答案：E 题解：感染为最常见的诱因，尤以呼吸道感染为最多见。

7. 左心衰最早出现的症状为 A.白色浆液性泡沫痰 B.急性肺水肿 C.夜间阵发性呼吸困难 D.劳累性呼吸困难 E.尿量减少

答案：D 题解：劳累性呼吸困难是左心衰最早出现的症状。

8. 近年来，在慢性心力衰竭治疗中常用的卡托普利属哪一类药物 A.血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) B.多巴胺类 C.血管紧张素受体阻滞剂 D.磷酸二酯酶抑制剂 E.受体阻滞剂

答案：A 题解：血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 卡托普利等是近年来在慢性心衰治疗中常用的药物。

9. 老年患者，常于夜间发作哮喘，伴频繁咳嗽，咳出泡沫痰，有时带血性，双肺底闻湿性音。以下哪一种疾病可能性大 A.心源性哮喘 B.支气管哮喘 C.过敏性肺炎 D.肺癌 E.喘息型支气管炎

答案：A 题解：心源性哮喘与支气管哮喘临床表现有时难以区分，但前者常发生于夜间平卧时，白色浆液性泡沫痰、痰中血丝为其特点，可资鉴别。

10. 患者，男性，49岁，因劳累后胸痛3年收住入院，患者均于劳累当时发作，休息后5~10分钟内缓解。入院后根据其发作时的心电图诊

为“心绞痛”，其发作时最可能的心电图表现是 A.T波高大
B.左室肥厚劳 C.窦性心动过速 D.ST段呈短暂性的抬高，形成
单向曲线 E.ST段下移，T波低平，双向，倒置 答案：E 题解
：患者为典型的稳定性劳累型心绞痛，心电图改变应如题。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com