

非抗生素类抗感染药：抗结核、麻风分支杆菌类药6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/254/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_254845.htm

【摘要】乙硫异烟胺属于抗结核、麻风分支杆菌类栏目，主要讲述了药物名称乙硫异烟胺 药物别名 英文名称 Ethionamide 说明 肠溶片：每片0.8g，一次服用或分次服（以一次服效果为好），必要时也可从小剂量（0.3g / 日）开始。注意事项（1）服药后有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、厌食、胃部不适等症状，多于服药2~3周后发生，如不能耐受，可酌减剂量或暂停服药，俟症状消失后继续服用。如合用碳酸氢钠，或服肠溶片，可减轻反应。在发生呕吐时，可同时使用止吐药物。（2）少数患者有糙皮病症状、精神抑郁、视力紊乱和头痛、末梢神经炎、经期紊

【关键字】抗结核、麻风分支杆菌类.药物.一次.剂量.服药.乙硫异烟胺【全文】药物名称 乙硫异烟胺药物别名 英文名称 Ethionamide说明 肠溶片：每片0.1g。功用作用对结核杆菌有抑菌作用，抗菌活性仅为异烟肼的十分之一。本品口服易吸收，体内分布广，可渗入全身体液（包括脑脊液），在体内全部代谢为无效物。对渗出性及浸润性干酪病变疗效较好。单独应用少，常与其他抗结核病药联合应用以增强疗效和避免病菌产生耐药性。用法用量 1日量0.5~0.8g，一次服用或分次服（以一次服效果为好），必要时也可从小剂量（0.3g / 日）开始。注意事项（1）服药后有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、厌食、胃部不适等症状，多于服药2~3周后发生，如不能耐受，可酌减剂量或暂停服药，俟症状消失后继续服用。如合用碳酸氢钠，或服肠溶片，可减轻反应。在发生呕吐时，可同时使用止吐药物。（2）少数患者有糙皮病症状、精神抑郁、视力紊乱和头痛、末梢神经炎、经期紊

乱、男子乳房女性化、脱发、关节痛、皮疹、痤疮等。（3）20% ~ 30%病人可对肝功能有影响，引起氨基转移酶升高，并可发生黄疸，故每月应测肝功能一次。（4）孕妇和12岁以下儿童禁用。（5）大剂量可引起体位性低血压。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com