

非抗生素类抗感染药：喹诺酮类-培氟沙星 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/255/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c67\\_255620.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c67_255620.htm) 【摘要】培氟沙星属于喹诺酮类栏目，主要讲述了药物名称培氟沙星药物别名甲氟哌酸、甲磺酸培氟沙星片、维宁佳片、甲培新 Peflacine 英文名称 Pefloxacin 说明片剂：200、400mg。功用作用本品为第三代喹诺酮类抗菌药，具有广谱抗菌作用，对肠杆菌科细菌如大肠杆菌、克雷白菌属、变形杆菌属、志贺菌属、伤寒沙门菌属等以及流感...。本文重点关注药物作用抗菌感染等内容，您可以在本页对培氟沙星进行讨论【关键字】喹诺酮类.药物.作用.抗菌.感染.培氟沙星【全文】药物名称培氟沙星药物别名甲氟哌酸、甲磺酸培氟沙星片、维宁佳片、甲培新 Peflacine英文名称 Pefloxacin说明片剂：200、400mg；粉针剂：400mg。功用作用本品为第三代喹诺酮类抗菌药，具有广谱抗菌作用，对肠杆菌科细菌如大肠杆菌、克雷白菌属、变形杆菌属、志贺菌属、伤寒沙门菌属等以及流感杆菌、奈瑟菌等具有强大抗菌活性，对金葡菌和绿脓杆菌亦有一定抗菌作用。对肺炎球菌、各组链球菌和肠球菌仅具轻度作用。本品为杀菌剂，作用机制为抑制细菌DNA螺旋酶。用于感菌所致呼吸道感染、尿路感染、妇科感染、骨和关节感染、心内膜炎、软组织感染等。用法用量成人，口服，400mg/次，2次/日，首剂800mg。静滴：400mg，2次/日。淋球菌感染及软下疳，800mg顿服。注意事项 对孕妇、哺乳期妇女、18岁以下患者禁用。 对本品或其他喹诺酮类药物有过敏史者禁用。 有中枢神经系统疾患者慎用。 有严重肝功能

损害者剂量宜酌减。 避免同时服用茶碱、含镁或氢氧化铝  
抗酸剂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详  
细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)