

执业医师资格考试协和练习题：胸部闭合性损伤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c67_257504.htm

胸部闭合性损伤（肋骨骨折、血胸和气胸）

- 下列哪些项目诊断肋骨骨折是不可靠的
A 间接疼痛
B 胸壁反常呼吸运动
C 骨擦感
D 局部疼痛
E 受伤后胸部变形
D
- 胸部损伤后咯血或痰中带血提示
A 气胸
B 血胸
C 肺或支气管损伤
D 食管损伤
E 损伤性窒息
C
- 开放性胸部损伤诊断的主要依据是
A 胸部皮肤裂伤
B 气管或食管裂伤
C 肋骨骨折刺破胸膜
D 胸壁创口与胸膜腔相通
E 开放性肋骨骨折
D
- 容易发生骨折的肋骨是
A 1～3肋
B 4～7肋
C 8～10肋
D 11～13肋
E 肋软骨
B
- 胸部损伤下述哪种情况为剖胸探查手术适应证
A 气胸肺萎陷超过30%
B 多根多处肋骨骨折
C 胸部爆震伤
D 进行性血胸
E 损伤性窒息发绀严重
D
- 诊断肋骨骨折下述哪项是可靠的
A 直接疼痛
B 局部肿胀
C 间接疼痛
D 皮下气肿
E 伤部皮下瘀血
C
- 胸部损伤外科治疗原则是
A 纠正酸碱平衡失调
B 纠正电解质紊乱
C 给予脱水利尿剂
D 给予止痛，输血
E 纠正循环、呼吸功能障碍
E
- 闭合性多根多处肋骨骨折，若骨折范围较小，治疗时采用哪种方法纠正反常呼吸最合适
A 牵引固定法
B 压力包扎固定
C 肋骨内固定法
D 胶布肋骨固定法
E 用呼吸器行辅助呼吸
B
- 能出现反常呼吸的肋骨骨折是
A 两根肋骨骨折
B 两根以上肋骨骨折
C 双侧肋骨单根骨折
D 多根多处肋骨骨折
E 多发性肋软骨骨折
D
- 闭合性气胸，肺萎陷不超过百分之几，患者可无自觉症状，不需处理
A 10%
B 20%
C 30%
D 40%
E 50%
C
- 多根多处肋骨骨折急救要点主要是
A 输血补液，防治休克
B 控制反常呼吸，保持呼吸道通畅
C

立即行开胸探查术D 加压给氧E 镇静、镇痛 B 12.损伤性窒息最常见的原因是A 胸部撞击伤B 胸部摔伤C 胸部暴力挤伤D 胸部扑打伤E 胸部高压气浪冲击伤 C 13.张力性气胸行闭式引流术，肺膨胀漏气停止，拔管最合适的时间是A 可立即拔管B 24小时后拔管C 48小时后拔管D 72小时后拔管E 一周后拔管 B 14.进行性血胸是指A 损伤后DICB 血胸量大于500mlC 血胸量大于1000mlD 胸腔闭式引流一次放出血量达500mlE 闭式引流后，引流量每小时大于200ml，持续3小时 E 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com