

2007年国家临床执业助理医师资格考试习题十七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9B\\_BD\\_c67\\_257632.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c67_257632.htm)

2007年国家临床执业助理医师资格考试习题答案十七第六篇 外科学第一单元 复苏A1型题1

1. 循环骤停进行复苏时最有效的药物是A. 肾上腺素B. 异丙肾上腺素C. 去甲肾上腺素D. 间羟胺E. 多巴胺
2. 循环骤停施行胸外心脏按压时正确的方法是A. 按压左胸部使心脏受到挤压B. 在右侧胸部加压C. 在胸骨上段按压D. 在胸骨中下1/3交界处、压力要使胸骨下沉3~4cmE. 在剑突下向心脏方向按压
3. 循环骤停是指心脏不能搏出有效的血液供给主要脏器的需要，下列叙述哪项与其不符A. 心脏完全停搏B. 心机械分离，心电图有心室融合波C. 心室颤动D. 一侧心室颤动而另一侧心室完全停搏E. 心跳微弱
4. 一经确定为心跳停止，紧急处理必须争取在几分钟内重建氧化血循环A. 1mmB. 6mmC. 9mmD. 3.5mmE. 12mm
5. 如你在路上遇一老年男性突然晕倒，为判断情况首先采取下列哪一步骤A. 检查有无颈动脉搏动B. 捶击心前区C. 口对口人工呼吸D. 开始胸外按摩E. 以上同步进行
6. 成人在下列何种情况下应行人工呼吸A. 潮气量小于150mlB. 肺活量小于500mlC. 呼吸频率小于20次/分或大于35次/分D. 呼吸暂停15~20秒E. 呼吸暂停20秒
- A2型题
7. 胸主动脉瘤患者夜间起床时摔倒，突感胸痛、气短，继之神志丧失、心跳停止，考虑为胸主动脉瘤破裂，拟立即入手术室行体外循环抢救，此时下列步骤哪项是错误的A. 立即托起下颌，保持呼吸道通畅B. 立即开始口对口人工呼吸C. 立即胸外心脏按压，

建立人工循环D．立即开放静脉输血、输液E．人手术室尽快麻醉手术、体外循环抢救8．女，37岁，突然心跳、呼吸停止送入医院，急行胸外心脏按压，气管插管人工呼吸。此时，抢救用药的最佳途径为A．心内注射B．静脉注射C．肌肉注射D．皮下注射E．气管内注射 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)