

抗肿瘤药：抗生素类抗肿瘤药-阿柔比星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c67\\_257633.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_257633.htm) 【摘要】阿柔比星属于抗生素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了用法用量 静脉注射或滴注，成人急性白血病每次按体重0.4mg/kg，1次/日，10日~15日/疗程。实体瘤及恶性淋巴瘤，每次按体重0.8mg~1.0mg/kg，2次/周；或每按体重0.4mg/kg，连用7日，休息7日再重复。妊娠、哺乳期妇女及心功能异常或有心功能异常史的病人禁用。。本文重点关注用量 体重 功能 异常 等内容，您可以在本页对阿柔比星进行讨论【关键字】抗生素类抗肿瘤药.用量.体重.功能.异常.阿柔比星【全文】药物名称 阿柔比星药物别名 阿克拉霉素A Aclacinomycin A，Aclacin，Acla英文名称 Aclarubicin说明 粉针剂：20mg。功用作用 急性粒细胞性白血病，亦用于乳腺癌、卵巢癌、肺癌、胃癌及恶性淋巴瘤。用法用量 静脉注射或滴注，成人急性白血病每次按体重0.4mg/kg，1次/日，10日~15日/疗程。实体瘤及恶性淋巴瘤，每次按体重0.8mg~1.0mg/kg，2次/周；或每按体重0.4mg/kg，连用7日，休息7日再重复。妊娠、哺乳期妇女及心功能异常或有心功能异常史的病人禁用。年老体弱、儿童、心肺肾能异常者慎用。细胞内本品浓度在长期维持于低血浆浓度时作用可大为增强，因而有人主张本品宜用持续点滴给药法。本品的肝清除量较高，适用于局部化疗如肝动脉插管给药或腹腔内化疗。注意事项 妊娠D类，对本品、多柔比星、表柔比星过敏者及用过足量多柔比星或表柔比星者禁用。周围血象中白细胞或血小板低、发热或伴明显感染、恶液质、失水、出血、电解质或酸碱平衡失调、胃肠道梗阻、明显黄疸或肝肾功能及心肺功能不全者均禁用本

品。肝肾功能损害，用量应酌减。2岁以下幼儿和大于60岁的老年病人慎用，且用药剂量应相应减少。以往做过胸部放射治疗或用过大剂量环磷酰胺者，本品的每次用量和总累积剂量均应相应减少。在用药期间和周围血象白细胞减少时禁行牙科手术（包括拔牙），并要保证每日有足够的排尿量。用药期间及停用本品后3个月～6个月内禁行病毒疫苗接种。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)