

抗肿瘤药：抗生素类抗肿瘤药-吡喃阿霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c67\\_257636.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_257636.htm) 【摘要】吡喃阿霉素属于抗生素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 吡喃阿霉素 药物别名 吡柔比星，THP-ADM 英文名称 Perarubicin 说明 注射用吡喃阿霉素：每支10mg。用法用量 THP以5%葡萄糖注射液或蒸馏水10ml溶液溶解。 每次15~30mg / 15~30ml溶液，膀胱内注入，保留1~2小时，每周3次，2~3周为1疗程。静脉注射时药液漏至皮下，可引起...。本文重点关注阿霉素 ml 药物 注射 等内容，您可以在本页对吡喃阿霉素进行讨论【关键字】抗生素类抗肿瘤药.阿霉素.ml.药物.注射.吡喃阿霉素【全文】药物名称 吡喃阿霉素 药物别名 吡柔比星，THP-ADM英文名称 Perarubicin说明 注射用吡喃阿霉素：每支10mg；20mg，内含乳糖90mg、180mg。功用作用 对头颈部癌、乳腺癌、膀胱癌、输尿管癌、肾盂癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性淋巴瘤和急性白血病有效，单药有效率为20%~30%，恶性淋巴瘤为50%。动脉给药和膀胱内给药的疗效则明显提高。用法用量 THP以5%葡萄糖注射液或蒸馏水10ml溶液溶解。剂量与用法： 25~40mg / m<sup>2</sup> / 次，静脉冲入，3~4周重复； 7~20mg / m<sup>2</sup> / 次，静脉冲入，1日1次，连用5天，3~4周重复； 每次15~30mg / 15~30ml溶液，膀胱内注入，保留1~2小时，每周3次，2~3周为1疗程。注意事项 毒副作用为骨髓抑制，表现为白细胞减少和血小板减少，食欲不振、恶心、呕吐、口腔炎、乏力、发热，少数有腹泻、肝肾功能损伤。脱发、心脏毒性和胃肠道反应

较ADM为轻。静脉注射时药液漏至皮下，可引起局部炎症。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)