

解热止痛药索米痛片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E8_A7_A3_E7_83_AD_E6_AD_A2_E7_c23_260355.htm

药物名称 索米痛片

药物别名 去痛片、索灭痛、氨基比林/非那西汀/咖啡因/苯巴比妥

英文名称 Somedon 说明片剂：每片含氨基比

林150mg、非那西汀150mg、咖啡因50mg、苯巴比妥15mg功用

作用 为一复方解热镇痛药。其中氨基比林和非那西汀能抑制

下视丘前列腺素的合成和释放，恢复体温调节中枢感受神经

元的正常反应性而起退热作用；同时还通过抑制前列腺素等

的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前

列腺素的合成和释放，稳定溶酶体酶，影响吞噬细胞的吞噬

作用而起到抗炎作用。咖啡因为中枢神经兴奋药，能兴奋大

脑皮层，提高对外界的感应性，并有收缩脑血管，加强前两

药缓解头痛的效果。苯巴比妥具有镇静、催眠、抗惊厥作用

，可增强氨基比林和非那西汀的镇痛作用，并预防发热所致

之惊厥。感冒引起的发热、关节痛、神经痛、头痛以及偏头

痛、痛经等轻至中度疼痛，尤其适用于对阿司匹林过敏或不

适于用阿司匹林者（如水痘、血友病、出血性疾病、抗凝治

疗的病人以及消化性溃疡、胃炎患者等）。用法用量口服，

成人0.3g~0.6g/次，4次/日，最大量2g/日，退热疗程不超过3

日，镇痛不宜超过10日。小儿按体重每次10mg~15mg/kg，

每4h~6h服1次；12岁以下小儿不超过5次/日，疗程不超过5日

。注意事项 妊娠B类。肝、肾功能不全患者及孕妇慎用。大

量或长期用药应定期作造血功能及肝功能检查。中毒时可用

乙酰半胱氨酸解毒，开始口服按体重140mg/kg，然后

以70mg/kg每4h服1次，共用17次，病情严重时可静脉给。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com