

药学综合技能(第一套) PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_260359.htm

一、A型题(最佳选择题)共50题。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 药品标准的首要内容是A. 药品质量 B. 药品名称 C. 药品命名 D. 合理用药 E. 药品说明书
2. 以下哪个项目在药品说明书中可以不写A. 药品名称 B. 不良反应 C. 药物相互作用 D. 老年患者用药 E. 孕妇及哺乳期妇女用药
3. 下列哪条是处方法律意义的正确提法A. 因处方引起的差错或造成医疗事故时，医师或药师应负的法律 responsibility B. 是因开具处方引起医疗纠纷时，以明确医师的法律 responsibility C. 是调配处方错误而引起医疗纠纷时，以明确药师的法律 responsibility D. 因处方是药品消耗及支出后经济收入的凭据，备查经济上的法律 responsibility E. 处方是医师、药师、护士为患者开方调配和给药是否正确的法律依据
4. 关于处方用药剂量与剂量单位下列说法错误的是A. 凡药典收载的品种，使用剂量应以《临床用药须知》剂量为准 B. 药典未收载的，应以法定说明书所示剂量为准 C. 医师超剂量使用应在剂量旁重签字 D. 剂量书写一律用阿拉伯字码，用药剂量采用公制 E. 注射剂一般注明支数、瓶数即可
5. 关于单剂量配方制，下列说法错误的是A. 又称单元调剂、单剂量配发药品或UDDS B. 可防止病人服错药或重复服药 C. 就是将病人所需服用的各种液体及固体制剂按一次剂量借助分包机用铝箔或塑料袋热合后单独包装 D. 避免了过去无法识别、无法核对的缺点 E. 提高了制剂的稳定性
6. 老年人对强心苷类药物敏感性增加，小剂量即可引起老年人恶心，

一般给予老年人为成人常用量的A . 1/5-1/6B . 3/4C .
1/2-1/4D . 4/5E . 1/8-1/107 . 不能避免肝脏首过效应的剂型
是A . 注射剂B . 气雾剂C . 栓剂D . 溶液剂(内服用)E . 舌下
含片剂8 . 以下关于合理用药的说法不正确的是A . 用药时应
力求应用得当 , 趋利避害B . 用药是指病人服用药物的过程C
 . 合理用药的含义包括安全、有效、经济、适当地用药D .
病人的依从性与药物使用是否方便、不良反应轻重等因素有
关E . 合理用药的意义和目的就是要充分发挥药物的作用9 .
不合理用药的表现之一为A . 收受药品回扣B . 使用过期药
品C . 选用药物不当D . 发生药物不良反应E . 审查处方不严
格10 . 以下哪项不是不合理用药的药师因素A . 审查处方不
严B . 未正确执行医嘱C . 调剂配发错误D . 用药指导不力E .
协作交流不够 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载
。 详细请访问 www.100test.com