

抗肿瘤药：抗生素类抗肿瘤药-平阳霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/261/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c67\\_261456.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_261456.htm) 【摘要】平阳霉素属于抗生素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 平阳霉素 药物别名 pingyangmycin，pym 英文名称 bleomycin a5 说明 注射用平阳霉素：每支8mg。功用作用 平阳霉素对头颈部鳞癌、淋巴瘤、乳腺癌、食管癌及鼻咽癌等均有效，对其他处的鳞癌如肺、子宫颈及皮肤也有效。用法用量 肌肉、静脉或肿瘤内注射，一次8mg，隔日...。本文重点关注平阳霉素 药物注射 等内容，您可以在本页对平阳霉素进行讨论【关键字】抗生素类抗肿瘤药.平阳.霉素.药物.注射.平阳霉素【全文】药物名称 平阳霉素 药物别名 pingyangmycin，pym 英文名称 bleomycin a5 说明 注射用平阳霉素：每支8mg。功用作用 平阳霉素对头颈部鳞癌、淋巴瘤、乳腺癌、食管癌及鼻咽癌等均有效，对其他处的鳞癌如肺、子宫颈及皮肤也有效。用法用量 肌肉、静脉或肿瘤内注射，一次8mg，隔日一次，一疗程总量240mg 注意事项 可有发热、胃肠道反应、皮肤反应（色素沉着、皮炎、角化增厚、皮疹等）、脱发、肢端麻痛、口腔炎等。本品与博莱霉素相比引起化学和性肺炎或肺纤维变的机会较小。但用药期间应注意检查肺部，如出现肺炎样变应停药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)