

抗肿瘤药：激素类抗肿瘤药-雌二醇氮芥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_265083.htm 【摘要】雌二醇氮芥属于激素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 雌二醇氮芥 药物别名 癌腺治，依立适 Estracyt 英文名称 Estramustine 说明 胶囊：每粒150mg。用法用量 静注：每日300~500mg溶于溶剂中静注，连用3周，然后改为每周2次。或改为口服。注意事项 附带的粉针溶剂需小心缓慢地加入雌二醇氮芥的安瓶中，并避免震动，...。本文重点关注雌二醇 药物 溶剂 改为 等内容，您可以在本页对雌二醇氮芥进行讨论【关键字】激素类抗肿瘤药.雌二醇.药物.溶剂.改为.雌二醇氮芥【全文】药物名称 雌二醇氮芥 药物别名 癌腺治，依立适 Estracyt 英文名称 Estramustine 说明 胶囊：每粒150mg。粉针剂：每支150mg；300mg。功用作用 前列腺癌、乳腺癌、胰腺癌，对其它晚期恶性肿瘤也有疗效。用法用量 静注：每日300~500mg溶于溶剂中静注，连用3周，然后改为每周2次；或改为口服；每日600~900mg，分2次。静脉或口服一般3~4周为1疗程，无效停用。注意事项 附带的粉针溶剂需小心缓慢地加入雌二醇氮芥的安瓶中，并避免震动，以防止起泡沫。等渗盐水不能作为溶剂使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com