

中药图谱大全：黄精图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c67_265296.htm

【药名】：黄精 **【拼音】**：HUANGJING **【英文名】**：Manyflower Solomonseal Rhizome Siberian Solomonseal Rhizome King Solomonseal Rhizome

【来源】：为双子叶植物药百合科植物黄精、囊丝黄精、热河黄精、滇黄精、卷叶黄精等的根茎。

【功效】：补中益气，润心肺，强筋骨。**【主治】**：治虚损寒热，肺癆咳血，病后体虚食少，筋骨软弱，风湿疼痛，风癩癬疾。

《别录》：“主补中益气，除风湿，安五脏。” 《日华子本草》：“补五劳七伤，助筋骨，止饥，耐寒暑，益脾胃，润心肺。” 《滇南本草》：“补虚添精。” 《纲目》：“补诸虚，止寒热，填精髓，下三尸虫。”

《本草从新》：“平补气血而润。” 《现代实用中药》：“用于间歇热、痛风、骨膜炎、蛔虫、高血压。”

《四川中药志》：“补肾润肺，益气滋阴。治脾虚面黄，肺虚咳嗽，筋骨酸痹无力，及产后气血衰弱。” 《湖南农村常用中草药手册》：“补肾健脾，强筋壮骨，润肺生津。”

【性味归经】：甘，平。 《别录》：“味甘，平，无毒。” 《四声本草》：“寒。”

入脾、肺、肾经。 《雷公炮制药性解》：“入脾、肺二经。” 《玉楸药解》：“入足太阴脾、足阳阴胃。”

《本草再新》：“入心、脾、肺、肾。” **【用法用量】**：内服：煎汤，3~5钱(鲜者1~2两)；熬膏或入丸、散。外用：煎水洗。

【用药忌宜】：中寒泄泻，痰湿痞满气滞者忌服。 《纲目》：“忌梅实，花、叶、子并同。” 《本经逢

原》：“阳衰阴盛人服之，每致泄泻痞满。” 《得配本草》：“气滞者禁用。” 《本草正义》：“有湿痰者弗服。胃纳不旺者，亦必避之。【别名】：龙衔(《广雅》)、太阳草(张华《博物志》)、白及、兔竹、垂珠、鸡格(《抱朴子》)、鹿竹、重楼(《别录》)、萎蕤、苟格、马箭、笔菜(《本草图经》)、黄芝(《灵芝瑞草经》)、笔管菜(《救荒本草》)、生姜(《滇南本草》)、野生姜(《本草蒙筌》)、野仙姜(《广西通志》)、山生姜(《本草备要》)、玉竹黄精、白芨黄精(《本草从新》)、阳雀蕤(《辰溪志》)、土灵芝、老虎姜(《草木便方》)、山捣臼(《岭南采药录》)、鸡头参(《山西中药志》)、黄鸡菜(《中药志》)、山姜(《湖南农村常用中草药手册》)。热河黄精，又名：多花玉竹。【处方名】：生黄精、黄精、熟黄精、甜黄精、制黄精、酒黄精等生黄精为原药材去杂质，润透切片入药者。处方中写黄精指熟黄精，又称制黄精。为净黄精润软反复蒸二三次后晒干切片入药者。甜黄精又称乌黄精。为净黄精九蒸九晒后入药者。减缓对咽喉刺激，增强补益作用。酒黄精又称炙黄精。为净黄精加酒和黑豆等辅料蒸后切片晒干入药者。兼有通经络之功。【商品名】：长叶黄精：为同属植物长叶黄精*P. multiflorum* L. var. *longifolium* Merr. 的根。分布于浙江、福建、广东、广西、湖南、江西、贵州等地。多花黄精：为同属植物多花黄精*P. multiflorum* L.的根。分布于广西、广东、湖南、湖北、安徽、河南等地。热河黄精：为同属植物热河黄精(又名多花玉竹)*P. macropodium* Turcz. 的根。分布于东北、河北等地。滇黄精：为同属植物滇黄精*P. kingianum* Coll. et Hemsl.的根。分布于云南等地。卷叶黄精：又名老虎姜、钩叶黄精。为同属

植物卷叶黄精*P. cirrhifolium* (Wall.) Royle的根。分布于陕西、甘肃、宁夏、湖北、四川、云南等地。玫瑰红黄精：又名紫花黄精。为同属植物玫瑰红黄精*P. roseum* (Ledeb.) Kunth的根。分布于新疆、河北、山西、湖北、四川等地。甘肃黄精：又名羊角参。为同属植物甘肃黄精*P. verticillatum* (L.) All.的根。分布于我国西北地区。弯花柱黄精：为同属植物弯花柱黄精*P. curvistylum* Hua的根。分布于宁夏。红果黄精：为同属植物红果黄精*P. erythrocarpum* Hua的根。分布于青海、甘肃等地。长梗黄精：为同属植物长梗黄精*P. filipes* Merr.的根。分布于浙江、福建。深山黄精：为同属植物深山黄精*P. lasianthum* Maxim.的根。分布于浙江、江西等地。裸花黄精：为同属植物裸花黄精*P. mouliei* Hua的根。分布于四川等地。对叶黄精：又名棒丝黄精。为同属植物对叶黄精*P. cathcartii* Bak.的根。分布于西藏等地。斑茎黄精：为同属植物斑茎黄精*P. marmoratum* Levl.的根。分布于广西等地。囊丝黄精：为植物囊丝黄精的根。金氏黄精：为植物金氏黄精的根。鸡头黄精：为植物黄精、狭叶黄精的根茎。结节略呈圆锥状，形似鸡头，故名鸡头黄精。姜形黄精：为植物长叶黄精、多花黄精及卷叶黄精的根茎。结节分枝短而瘦，形似生姜，故名姜形黄精。玉竹黄精：形似玉竹者。均以块大肥润、色黄、断面呈角质透明者为佳。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com