

抗肿瘤药：抗肿瘤辅助用药-阿可达 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/265/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c67\\_265658.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_265658.htm) 【摘要】阿可达属于抗肿瘤辅助用药栏目，主要讲述了药物名称阿可达 药物别名阿可达 英文名称 Aredia 说明 功用作用 恶性肿瘤及其骨转移引起的高钙血症及骨质破坏溶解，消除疼痛，改善运动能力，减少病理性骨折，减少患者对放射治疗的要求。9%生理盐水或5%葡萄糖250-500 mL中，静脉点滴1-4小时以上。用于一个疗程的治疗总量取决于病人治...。本文重点关注可达 mL 治疗 总量 等内容，您可以在本页对阿可达进行讨论【关键字】抗肿瘤辅助用药.可达.mL.治疗.总量.阿可达【全文】药物名称阿可达药物别名阿可达英文名称 Aredia说明 功用作用 恶性肿瘤及其骨转移引起的高钙血症及骨质破坏溶解，消除疼痛，改善运动能力，减少病理性骨折，减少患者对放射治疗的要求。可延缓骨溶解性病变的发展，而对有关合并症（如骨折、死亡率）没有作用。Pagets病的骨病变及多种原因引起的骨质疏松症。用法用量 成人及老年病人 一般用量是30-90 mg加入0.9%生理盐水或5%葡萄糖250-500 mL中，静脉点滴1-4小时以上。用于一个疗程的治疗总量取决于病人治疗前的血清钙水平。下表为根据治疗前血钙浓度而改进的本药治疗总量：

水(ml)	热卡(KCal)	葡萄糖(g)	氨基酸(g)	脂肪(g)
1岁	100 - 140	60 - 100	8 - 15	1.5 - 2.5
2岁	80 - 120	70 - 90	12 - 15	1.52 - 3
3-5岁	80 - 100	60 - 70	12	1.51 - 2
6-10岁	60 - 80	50 - 70	10	11 - 2
11-14岁	50 - 70	50	8	11

2岁以上的儿童可用成人氨基酸取代本药 总量可以1次滴注，亦可在2-4日中分次滴注。每个疗程的最

大总量为90 mg。治疗肿瘤引起的高钙血症，滴注速率不应超过15-30 mg/2小时，在滴注溶液中，本药的浓度不应大于15 mg/125 mL。注射后24-48小时，血清钙水平明显下降，在多数情况下，3-7天内可获得正常的血钙水平。若血钙未达正常，可重复治疗直至血钙降至正常，但随着疗程次数的增多，疗效会减低。注意事项 严重肾功能损害者、心血管疾病者及驾驶员慎用。本药不可一次静脉推注。不应将本药与其它二磷酸盐合用于治疗高钙血症。治疗期间应定期检查血清电解质，尤其是钙和磷，血小板数以及肾功能。用药须知：15 mg干粉应以注射用水配制至5 mL，30 mg干粉应以注射用水配制至10 mL，稀释后缓慢滴注。不应将本药加入含钙的溶液中滴注。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)