

解热镇痛药:镇痛药芬布芬〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/266/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A7\\_A3\\_E7\\_83\\_AD\\_E9\\_95\\_87\\_E7\\_c23\\_266660.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/266/2021_2022__E8_A7_A3_E7_83_AD_E9_95_87_E7_c23_266660.htm) 药物名称 芬布芬〔典〕 药物别名 联苯丁酮酸，LEDERFEN，BUFEMID

，NAPONOL英文名称 Fenbufen说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）150mg功用作用 为一较新型的长效非甾体消炎镇痛药。据动物实验结果，本品的消炎、镇痛作用虽较吲哚美辛低，但比阿司匹林强。毒性比吲哚美辛小，胃肠道副作用小于阿司匹林及其他非甾体消炎镇痛药。药理研究表明，本品在体内代谢成联苯乙酯，后者可抑制前列腺素的合成，从而阻断炎症介质的作用，认为这是本品消炎作用的主要机制。芬布芬作为联苯乙酯的前体物，口服后可避免直接服用活性代谢物对胃肠道的刺激。经国内试用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎，总有效率为87%。本药一般能使类风湿因子、血沉、抗链“O”等指标恢复正常或转阴。病理学检查未见主要脏器有明显病理改变。口服后2小时血药浓度达峰值。t<sub>1/2</sub>为12~17小时。用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎及痛风等的治疗。亦用于牙痛、手术后疼痛、外伤疼痛等的止痛。用法用量 口服，成人一日0.6~0.9g，一次或分次服。多数患者晚上一次口服0.6g即可。分次服用时每日总量不得超过0.9g。注意事项（1）少数患者服后有胃痛、恶心、头晕、皮疹、白细胞数微降等。个别患者出现氨基转移酶微升现象，但停药1周即自行恢复正常。（2）14岁以下儿童不宜服用。（3）胃与十二指肠溃疡者及孕妇、哺乳期妇女慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)