

2007年国家临床执业助理医师资格考试习题二十七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/268/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9B\\_BD\\_c67\\_268184.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c67_268184.htm)

2007年国家临床执业助理医师资格考试习题答案二十七第七章 妇产科学第十六单元 滋养细胞疾病A1型题

1. 葡萄胎重要的病理特征是A . 黄素化囊肿B . 绒毛构型完好C . 滋养细胞增生D . 绒毛间质水肿E . 间质内胚源性血管消失  
2 . 下列诊断依据哪项对葡萄胎最有意义A . 妊娠5个月摸不到胎体B . B超示落雪状图象C .

血HCG>100KIU / LD . 阴道排出水泡状组织E . 停经后阴道流血  
3 . 女性41岁，已生育，诊断为葡萄胎，子宫超过孕14周大，首选治疗是A . 清除宫内容物B . 手术切除子宫C . 先清宫再切除子宫D . 化疗E . 先化疗再清宫

4 . 绒癌最常见的转移部位依次是A . 肺、脑、肝、阴道B . 阴道、肺、肝、脑C . 肺、阴道、脑、肝D . 肝、脑：阴道、肺E . 肝、肺、阴道、脑

5 . 葡萄胎随访期间最好的避孕方法是A . 安全期B . 工具C . 带避孕环D . 药物E . 绝育术  
6 . 侵蚀性葡萄胎可以发生在A . 流产以后B . 足月产以后C . 葡萄胎以后D . 异位妊娠后E . 过期流产后

A2型题  
7 . 42岁女性，末次妊娠人流后8年，现停经3月，阴道流血3天，子宫增大，但小于停经月份，血HCG>100KIU / L。最可能的诊断是A . 先兆流产B . 宫外孕C . 葡萄胎D . 侵蚀性葡萄胎E . 绒癌

8 . 24岁女性，停经35天，阴道流血1天，血HCG>100KIU / L，最可能的诊断是A . 早期妊娠B . 多胎妊娠C . 先兆流产D . 异位妊娠E . 葡萄胎

A3型题(9 ~ 10题共用题干)  
27岁，女性，停经3个月，阴道不规则流血10余天，量时多时少，无腹痛，查体：轻度贫血

貌，宫底脐下1横指，未触及胎体，未闻及胎心9．首要诊断是A．双胎妊娠B．先兆流产C．葡萄胎D．羊水过多E．前置胎盘10．如需鉴别诊断，首选哪项辅助检查A．血HCGB．组织学检查C．B型超声D．分段诊刮E．X线检查(1113题共用题干)43岁，女，3个月前曾因葡萄胎行清宫术，随访HCG持续阳性11．目前最可能的诊断是A．葡萄胎残留B．持续性葡萄胎C．黄素化囊肿D．妊娠E．侵蚀性葡萄胎12．为鉴别诊断，目前最适宜的辅助检查是：A．血HCGB．组织学检查C．分段诊刮D．子宫输卵管碘油造影E．B型超声13．目前最适宜的处理方法是A．预防性化疗B．联合化疗C．手术治疗D．切除子宫E．继续随访观察 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)