

抗肿瘤药：激素类抗肿瘤药-甲羟孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/268/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c67\\_268189.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_268189.htm) 【摘要】甲羟孕酮属于激素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 甲羟孕酮 药物别名 羟甲孕酮，甲孕酮，安宫黄体酮，PROVERA，MPA 英文名称 Medroxyprogesterone 说明片剂：每片500mg。功用作用 主要用于治疗肾癌、乳腺癌、子宫内膜癌、前列腺癌及增强晚期癌症病人的食欲，改善一般状况和增加体重。注意事项 可引起孕酮类反应如乳...。本文重点关注孕酮 药物 增加体重 等内容，您可以在本页对甲羟孕酮进行讨论【关键字】激素类抗肿瘤药.孕酮.药物.增加.体重.甲羟孕酮【全文】药物名称 甲羟孕酮药物别名 羟甲孕酮，甲孕酮，安宫黄体酮，PROVERA，MPA英文名称 Medroxyprogesterone说明片剂：每片500mg。功用作用 主要用于治疗肾癌、乳腺癌、子宫内膜癌、前列腺癌及增强晚期癌症病人的食欲，改善一般状况和增加体重。用法用量 口服500～1000mg/d，1次或分2次，连用10日。以后视情况改为250～500mg/d，可长期服用。肌肉注射：开始每日1次500mg，最多四周，以后改为每周3次。注意事项 可引起孕酮类反应如乳房疼痛、溢乳、阴道出血、闭经、月经不调、宫颈分泌异常等；长期应用也有肾上腺皮质功能亢进的表现如满月脸、柯兴氏征、体重增加等。曾有报告可有阻塞性黄疸。此外，本品可引起凝血机能异常，所以栓塞性疾病或在应用过程中有血栓形成的征象如头痛、视力障碍等应即停药。有严重肝功能损害，有高钙血症倾向的病人也应禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)