

临床执业医师《内科学》辅导：SLE的关节和肌肉损害 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c67_268564.htm

临床执业医师《内科学》辅导：SLE的关节和肌肉损害 问题：关于SLE关节病变，哪项是错误的 A.关节肿痛 B.呈多关节对称性损害 C.近端指间关节多受累 D.关节软骨破坏，关节畸形 E.大关节很少受累

讨论：原题选D。新版教材中有如下描述：SLE时，常出现对称性多关节疼痛、肿胀、通常不引起骨质破坏。激素治疗中的SLE病人出现髌关节区域或膝关节隐痛不适，需注意缺血性股骨头坏死。SLE可出现肌痛和肌无力，少数可有肌酶谱的增高。（注：此版教材则选D。）5版教材中有如下描述：

在SLE疾病中，约85%的患者在病程中有关节疼痛，最常见于指，腕，膝等关节，伴关节红肿者较为少见。偶有指关节变形。常见表现为对称的多关节痛，呈间歇性。关节X线片大多数正常，约40%可有肌痛，5%可有肌炎。（依5版教材，B和D均是错误的。）相关名词 系统性红斑狼疮：systemic lupus erythematosus，SLE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com