

中国药典2000版一部：杏仁止咳糖浆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269667.htm 【全文】

中药名称杏仁止咳糖浆拼音名Xingren Zhike Tangjiang性状本品为淡棕色液体；具杏仁香气，味甜而带苦涩。鉴别取本品50ml，置水浴上蒸至近干，加硅藻土10g，研匀，加醋酸乙酯50ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加醋酸乙酯0.5ml，作为供试品溶液。另取陈皮对照药材0.5g，加醋酸乙酯10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-丙酮（9:4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方杏仁水40ml 百部流浸膏20ml 远志流浸膏22.5ml 陈皮流浸膏15ml 桔梗流浸膏20ml 甘草流浸膏15ml 制法 以上六味，另取蔗糖244g加水加热溶化，待冷，加入苯甲酸钠适量，依次加入远志流浸膏、桔梗流浸膏、甘草流浸膏、百部流浸膏、陈皮流浸膏、杏仁水，混匀，加水调节至1000ml，加滑石粉适量，搅匀，静置使沉淀，滤取上清液，灌装，即得。检查 相对密度 应不低于1.09（附录 A）。pH值 应为5.0~7.0（附录 G）。其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定（附录 H）。功能与主治 化痰止咳。用于急、慢性支气管炎，咳嗽痰多。用法与用量 口服，一次15ml，一日3~4次。贮藏 密封，置阴凉干燥处。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com