

外科护理:切口疼痛护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E6_8A_A4_E7_c67_269682.htm 病人术后切口疼痛多在麻醉作用消失后，感觉开始恢复，切口疼痛就逐渐加剧，尤以手术当天下午和晚间疼痛最剧烈，次日减轻。病人表现呻吟、出汗、转辗不安、不敢移动身体、不敢用力咳嗽。此时护理人员要针对病人手术情况作相应解释、劝慰，并细心检查，排除加剧切口疼痛的其他原因，然可给镇痛剂，使病人得到安静休息。常用止痛药物有止痛片、强痛定、哌啶、吗啡等。对小手术后引起疼痛用去痛片类就可达到止痛目的；对中、大手术切口疼痛可用强痛定、哌啶肌肉注射，有镇痛、止痛、搞痉挛作用，对呼吸抑制作用也较小。手术后应用麻醉止痛药物应注意：麻醉作用已过，病人已能自解小便，此时给药较妥当。需要时镇痛剂可每隔4~6小时给1次，但不必定时给，一般在2~3日后，切口疼痛明显减轻应停止使用。以免过量成瘾。如病人仍疼痛难忍，即应检查切口局部有无红、痛、热，如伴有体温和白细胞升高，则考虑为切口感染，应与医生联系 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com