

原发性恶性骨肿瘤病人标准护理计划 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E5_8E_9F_E5_8F_91_E6_80_A7_E6_c67_269692.htm

原发性恶性骨肿瘤是来自骨骼系统本身的恶性肿瘤，以骨肉瘤最为多见，多发于股骨下端和胫骨上端。临床表现常为明显的局部症状（疼痛、肿胀及功能受限），继之而来的是全身性的恶病质表现。

采取以手术为主的联合治疗方法。该病预后较差，病人身心痛苦。护理主要在于帮助病人减轻躯体疼痛、克服悲观失望情绪、正视现实，使其能配合治疗。常见护理问题包括：

焦虑； 恐惧； 躯体移动障碍； 自理缺陷； 营养不足； 自我形象紊乱； 疼痛； 有皮肤受损的危险； 潜在并发症--伤口大出血； 知识缺乏：肿瘤局部护理知识。

一、焦虑 二、恐惧 三、躯体移动障碍 四、自理缺陷 以上一~四均参照"骨科病人一般标准护理计划"中的相关内容。

五、营养不足 相关因素：1 恶病质。2 食欲不振。 主要表现：1 消瘦、乏力。2 体重低于标准体重的20%。3 血清白蛋白、血红蛋白、血清铁低于正常。 护理目标：1 病人能摄入足够的营养食物。2 病人营养状态有所改善。 护理措施：1 向病人及其家属说明足够的营养对机体的重要性，强调营养在肿瘤治疗过程中的作用。2 尽量选择适合病人口味且营养丰富的食品。3 鼓励少食多餐，注意就餐环境。4 遵医嘱使用静脉营养支持疗法。 重点评价：1 病人营养状况是否改善。2 改善病人营养状况的护理措施是否适合于个体。 六、自我形象紊乱 参照"截肢术后病人标准护理计划"中的相关内容。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

