

中国药典2000版一部：少林风湿跌打膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/269/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_269762.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269762.htm)

【摘要】少林风湿跌打膏属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称 少林风湿跌打膏 拼音名 Shaolin Fengshi Dieda Gao 性状 本品为微红色的片状橡胶膏，布面具有小圆孔，气芳香。鉴别 取本品10片，置250ml 平底烧瓶中，加水150ml,连接挥发油测定器。自测定器端加水使充满刻度部分，并溢流入烧瓶为止，再加醋酸乙酯5ml,连接回流冷...。本文重点关注少林 风湿 ml 橡胶 等内容，您可以在本页对少林风湿跌打膏进行讨论【关键字】2000版一部.少林.风湿.ml.橡胶.少林风湿跌打膏【全文】中药名称少林风湿跌打膏拼音名Shaolin Fengshi Dieda Gao性状本品为微红色的片状橡胶膏，布面具有小圆孔，气芳香。鉴别 取本品10片，置250ml 平底烧瓶中，加水150ml,连接挥发油测定器。自测定器端加水使充满刻度部分，并溢流入烧瓶为止，再加醋酸乙酯5ml,连接回流冷凝管，加热回流40分钟，将挥发油测定器中的液体移至分液漏斗中，分取醋酸乙酯层，用铺有无水硫酸钠的漏斗滤过，滤液作为供试品溶液。另取薄荷脑8mg,冰片8mg 与水杨酸甲酯8mg,加乙醇10ml使溶解，作为对照品溶液。照气相色谱法（附录 E）试验，柱长为2m，以聚乙二醇(PEG)-20M 为固定液，涂布浓度为10%，柱温为130 。分别取对照品溶液和供试品溶液适量，注入气相色谱仪。供试品应呈现与对照品保留时间相同的色谱峰。处方生川乌 16g 生草乌 16g 乌药 16g白及 16g 白芷 16g 白蔹 16g土鳖虫 16g 木瓜 16g 三棱 16g莪术 16g 当归 16g 赤芍 16g肉桂 16g

大黄 32g 连翘 32g 血竭 10g 乳香（炒） 6g 没药（炒） 6g 三七 6g 儿茶 6g 薄荷脑 8g 水杨酸甲酯 8g 冰片 8g 制法 以上二十三味，血竭、乳香、没药、三七、儿茶粉碎成粗粉，用90%乙醇制成相对密度1.05流浸膏，其余生川乌等十五味，加水煎煮三次，第一、二次各3小时，第三次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.25~1.30(80℃)的稠膏。与上述流浸膏合并，待冷却后加入薄荷脑、水杨酸甲酯、冰片混匀，另加8.5~9.0倍重的由橡胶、松香等制成的基质，制成涂料，进行涂膏，切段，盖衬，切成小块，即得。检查含膏量 照橡胶剂含膏量测法（附录 Q）用乙醚作溶剂，每100cm<sup>2</sup>应不少于1.5g。其他 应符合橡胶膏剂项下有关的各项规定（附录 Q）。功能与主治 散瘀活血，舒筋止痛，祛风散寒。用于跌打损伤，腰肢酸麻，腹内积聚，风湿痛。用法与用量 贴患处。注意 孕妇慎用或遵医嘱。规格(1) 5×7cm (2) 8×9.5cm 贮藏 密封，置阴凉处。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)