

中国药典2000版一部：少腹逐瘀丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269763.htm

【摘要】少腹逐瘀丸属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称少腹逐瘀丸拼音名 Shaofu Zhuyu Wan 性状本品为棕黑色的大蜜丸。(2)取本品9g，加硅藻土10g,研匀，加乙醇50ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇提取3次，每次20ml，合并提取液，用正丁醇饱和的水洗涤3次，每次15ml，弃去水液，正丁醇...

。本文重点关注少腹逐瘀 ml 溶液 等内容，您可以在本页对少腹逐瘀丸进行讨论【关键字】2000版一部.少腹.逐瘀.ml.溶液.少腹逐瘀丸【全文】

中药名称少腹逐瘀丸拼音名 Shaofu Zhuyu Wan 性状本品为棕黑色的大蜜丸；气芳香，味辛、苦。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤型，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。花粉粒黄色，类圆形或椭圆形，直径约30 μm,外壁有微细疣状突起。草酸钙簇晶直径7~41 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行或一个细胞中含有数个簇晶。纤维单个散在，长梭形，直径24~50 μm,壁厚，木化。草酸钙簇晶细小，直径约5 μm，一个细胞含有多个簇晶。糊化淀粉粒团块淡黄色或几乎无色。(2)取本品9g，加硅藻土10g,研匀，加乙醇50ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇提取3次，每次20ml，合并提取液，用正丁醇饱和的水洗涤3次，每次15ml，弃去水液，正丁醇液蒸干，残渣加乙醇20ml使溶解，加活性炭2.5g，水浴加热脱色2分钟，放冷，滤过，滤液浓缩至1ml,作为供试品溶液。另

取芍药甙对照品，加乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液5~10 μl、对照品溶液2 μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以氯仿 - 醋酸乙酯 - 甲醇 - 甲酸(40:5:10:0.2) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方当归 300g 蒲黄 300g 五灵脂 (醋炒)200g 赤芍 200g 小茴香 (盐炒)100g 延胡索 (醋制)100g 没药 (炒) 100g 川芎 100g 肉桂 100g 炮姜 20g 制法 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜 100~110g制成大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 活血逐瘀，祛寒止痛。用于血瘀有寒引起的月经不调，小腹胀痛，腰痛，白带。用法与用量 温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2~3次。注意 孕妇忌服。规格每丸重9g 贮藏密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com