

中国药典2000版一部：山茱萸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269766.htm 【摘要】山茱萸属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称山茱萸拼音名

ShanZhuyu 英文名FRUCTUS CORNI 来源本品为山茱萸科植物山茱萸*Cornus officinalis* Sieb. 酒萸肉取净山萸肉，照酒炖法或酒蒸法（附录 D）炖或蒸至酒吸。检查杂质（果核、果梗）不得过3%（附录 A）。含量测定...。本文重点关注山茱萸附录溶液对照等内容，您可以在本页对山茱萸进行讨论【关键字】2000版一部.山茱萸.附录.溶液.对照.山茱萸

【全文】中药名称山茱萸拼音名ShanZhuyu英文名FRUCTUS CORNI来源本品为山茱萸科植物山茱萸*Cornus officinalis* Sieb. Et Zucc. 的干燥成熟果肉。秋末冬初果皮变红时采收果实，用文火烘或置沸水中略烫后，及时除去果核，干燥。性状本品呈不规则的片状或囊状，长1~1.5cm，宽0.5~1cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩，有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸、涩、微苦。鉴别本品粉末红褐色。果皮表皮细胞表面观多角形或类长方形，直径16~30 μ m，垂周壁连珠状增厚，外平周壁颗粒状角质增厚，胞腔含淡橙黄色物。中果皮细胞橙棕色，多皱缩。草酸钙簇晶少数，直径12~32 μ m。石细胞类方形、卵圆形或长方形，纹孔明显，胞腔大。炮制山萸肉除去杂质和残留果核。酒萸肉取净山萸肉，照酒炖法或酒蒸法（附录 D）炖或蒸至酒吸。检查杂质（果核、果梗）不得过3%（附录 A）。含量测定取本品粗粉约1g，精密称定，置索氏提取器中

，加乙醚适量，加热回流提取4小时，提取液回收乙醚至干，残留物用石油醚（30~60℃）浸泡2次，每次15ml（约浸泡2分钟），倾去石油醚，残留物加无水乙醇-氯仿(3:2)混合液微热使溶解，定量移至5ml量瓶中，并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取熊果酸对照品，加无水乙醇制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液5 μl和10 μl,对照品溶液4 μl与8 μl，分别交叉点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-氯仿-醋酸乙酯(20:5:8)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸的乙醇溶液，在110℃烘5~7分钟，至呈现紫红色斑点，取出，在薄层板上覆盖同样大小的玻璃板，周围用胶布固定，照薄层色谱法（附录 B薄层扫描法）进行扫描，波长： $\lambda_s = 520\text{nm}$ ， $\lambda_R = 700\text{nm}$ ，测量供试品吸收度积分值与对照品吸收度积分值，计算，即得。本品含熊果酸($\text{C}_{30}\text{H}_{48}\text{O}_3$)不得少于0.2%。性味与归经 酸、涩，微温。归肝、肾经。功能与主治 补益肝肾，涩精固脱。用于眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。用法与用量 6~12g。贮藏置干燥处，防蛀。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com