

中国药典2000版一部：木香分气丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/269/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_269980.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269980.htm)

【摘要】木香分气丸属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称木香分气丸拼音名 Muxiang Fenqi Wan 性状本品为黄褐色的水丸。(2)取本品10g,研细，加甲醇20ml超声处理5分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取木香对照药材0.5g，加甲醇10ml，同法制成对照药材溶液。。本文重点关注木香 ml 甲醇 溶液 等内容，您可以在本页对木香分气丸进行讨论【关键字】2000版一部.

木香.ml.甲醇.溶液.木香分气丸【全文】中药名称木香分气丸拼音名Muxiang Fenqi Wan性状本品为黄褐色的水丸；气香，味微辛。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约125 μm。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。(2)取本品10g,研细，加甲醇20ml超声处理5分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取木香对照药材0.5g，加甲醇10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录

B）试验，吸取上述两种溶液各5 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯-甲醇(27:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取鉴别(2)项下的供试品溶液，蒸干，残渣加稀盐酸溶液20ml使溶液，用氯仿提取3次，每次20ml，合并氯仿液，用2%氢氧化钠溶液提取3次，每次20ml，合并氢氧化钠液，

加盐酸调pH1~2，用氯仿提取3次，每次20ml，合并氯仿液，用无水硫酸钠脱水，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取厚朴酚、和厚朴酚对照品，加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯-甲醇(27:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，105 $^{\circ}$ C烘约数分钟。供试品色谱中在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

处方木香 192g 砂仁 48g 丁香 48g 檀香 48g 香附（醋炙）384g 广藿香 48g 陈皮 192g 厚朴（姜炙）384g 枳实 192g 豆蔻 48g 莪术（醋炙）384g 楂（炒）192g 白术（麸炒）192g 甘松 192g 槟榔 96g 甘草 192g

制法 以上十六味，粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛丸，干燥，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 宽胸消胀，止胀。用于肝郁气滞，脾胃不和引起的胸膈痞闷，两胁胀满，胃脘疼痛，倒饱嘈杂，呕吐恶心，暖气吞酸。用法与用量 口服，一次6g，一日2次。注意 孕妇慎用。规格 每100丸重6g 贮藏 密封。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)