

头孢菌素类抗生素：头孢拉定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E8_8F_8C_E7_c67_270895.htm 药物名称头孢拉定
药物别名头孢环己烯，先锋霉素，VELOSEF英文名
称Cefradine说明胶囊剂；每胶囊0.25g；0.5g。干混悬剂
：0.125g；0.25g。注射用头孢拉定（添加碳酸钠）：每瓶0.5g
；1g。注射用头孢拉定A（添加精氨酸）：每瓶0.5g；1g。功
用作用抗菌性能类似头孢氨苄，对金黄色葡萄球菌、溶血性
链球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、肺炎克雷
白杆菌、流感嗜血杆菌等有抗菌作用。空腹口服250mg
或500mg，平均血药峰浓度于1小时内到达，分别为9或16.5 μg
/ ml。食物延迟本品吸收，但不影响吸收总量。90%药物在6
小时内以原形由尿排泄，口服250mg后，尿药峰浓度可达1600
 μg / ml。本品的肾毒性较轻微。静注本品1g，5分钟时血药
浓度为86 μg / ml；15分钟为50 μg / ml；30分钟为26 μg / ml
；1小时为12 μg / ml；到4小时为1 μg / ml。用于呼吸道、泌
尿道、皮肤和软组织等部位的敏感菌感染，注射剂也用于败
血症和骨感染。用法用量 成人1日口服1~2g，分3~4次服用
。小儿每日25~50mg / kg，分3~4次服用。肌注、静注或滴
注，成人1日2~4g，分4次注射；小儿1日量为50~100mg / kg
，分4次注射。肾功能不全者按患者肌酐清除率制订给药方
案：肌酐清除率 > 20ml / 分者，每6小时服500mg；15~20ml
/ 分者，每6小时服250mg；< 15ml / 分者，每12小时服250mg
。注意事项（1）对青霉素过敏或有过敏体质者及肾功能不
全者慎用。对头孢类抗生素过敏者禁用。（2）注射剂刺激

性较低，适宜于肌注应用。（3）可致菌群失调、维生素缺乏、二重感染等副作用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com