

西药解热镇痛药:镇痛药酮洛芬肠溶胶囊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E8_A7_A3_E7_c23_271302.htm 药物名称 酮洛芬肠溶胶囊 药物别名 酮基布洛芬 英文名称 Ketoprofen 说明 肠溶胶囊剂：25、50mg。本品为肠溶胶囊，内容物为白色粉末。功用作用 本品为芳香基丙酸衍生物，属非甾体抗炎镇痛药。本品除抑制环氧合酶外尚有一定抑制脂氧酶及减少缓激肽的作用，从而减轻炎症损伤部位疼痛感觉。因缓激肽与前列腺素一起可引起疼痛。缓激肽还可引起子宫收缩，故本品用于痛经，主要是通过抑制缓激肽，从而抑制子宫收缩和镇痛而起到疗效。本品尚有一定的中枢性镇痛作用。急性毒性试验结果：大鼠经口LD50为101mg/kg。类风湿性关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎、急性痛风等，对轻、中度的疼痛和痛经亦有缓解作用。用法用量 口服，成人抗风湿50mg/次，3次~4次/日，最大量300mg/日，饭后服用；痛经50mg/次，必要时增至75mg/次，3次~4次/日。为避免对胃肠道刺激，应饭后服用，整个胶囊吞服。[药物过量]服用常规剂量的5~10倍可导致嗜睡、恶心、呕吐和上腹部疼痛。大剂量的酮洛芬可引起呼吸抑制和昏迷。胃肠道出血、低血压、高血压或急性肾功能衰竭也可发生，但较少见。服药超量时应作紧急处理，包括催吐或洗胃、口服活性炭、抗酸药或（和）利尿剂，并给予检测及其他支持治疗。注意事项 妊娠B类（妊娠后期D类），妊娠及哺乳期妇女、小儿用药尚缺乏资料。有溃疡病史并出血史者及肝、肾功能不全、高血压、心衰者慎用。忘记一次服药时，不要在下次服药时加倍服

用。肾功能减退者用量应减少33%~50%。对阿司匹林或其他非甾体抗炎药有过敏者禁用；有活动性消化性溃疡者禁用。详细见下：（1）交叉过敏：对阿司匹林或其他非甾体抗炎药过敏者，本品可有交叉过敏反应。对阿司匹林过敏的哮喘患者，本品也可引起支气管痉挛。（2）有下列情况者应慎用：哮喘，用药后可加重；心功能不全、高血压、肾功能不全、肝硬化患者，用药后可加重水钠潴留，甚至导致心、肝、肾功能衰竭。血友病或其他出血性疾病（包括凝血障碍及血小板功能异常），用药后出血时间延长，出血倾向加重；有消化道溃疡病史者，应用本品时易出现胃肠道副作用，包括产生新的溃疡；（3）本品为治疗关节炎的对症药物，用药数天至1周见效，达最大疗效需连续用药2~3周。必须同时进行病因治疗。（4）肾功能不全者应酌情减量。（5）为了减少对胃肠道刺激，可与食物同服或饭后服用。对急需止痛患者，可于进食前30分钟或进食后2小时服药。（6）长期用药时应定期随诊，检查血象及肝、肾功能。一旦出现胃肠道出血、肝肾功能损害、视力障碍、精神异常、血象异常及过敏反应等异常情况，应立即停药、就诊。（7）对实验室检查的干扰：由于本品对血小板聚集有抑制作用，可使出血时间延长3~4秒；本品可使血钠浓度降低，血红蛋白及红细胞压积降低；本品可致血清碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶及转氨酶升高；由于本品在尿中代谢产物的干扰，可影响尿17-羟皮质类固醇（17-OHCS）的测定结果。[孕妇及哺乳期妇女用药]孕妇及哺乳期妇女不宜应用。[儿童用药]尚不明确。[老年患者用药]老年人应用本品时血浆蛋白结合率及药物排出速度可减低，导致血药浓度升高及半衰期延

长，因而需注意剂量调整。尤其大于70岁者，开始可用半量，如无效且耐受好，可逐渐增加至常用量，但应密切监护。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com