

西药麻醉用药：局部麻醉药丁卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_E9\\_BA\\_BB\\_E9\\_c23\\_272675.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E9_BA_BB_E9_c23_272675.htm) 药物名称 丁卡因药

物别名 地卡因，潘托卡因，四卡因，Amethocalne，Dlcalne，PONTOCAINE，PANTOCAINE，DECICAINE英文名称

Tetracaine说明 注射液：50mg（5ml）。功用作用 局麻作用比普鲁卡因强，毒性亦较大，能透过粘膜，主要用于粘膜麻醉。作用迅速，1～3分钟即生效。维持20～40分钟。眼科用0.5%～1%溶液，鼻喉科用1%～2%溶液，总量不得超过20ml。

用法用量 应用时应于每3ml中加入0.1%盐酸肾上腺素溶液1滴。浸润麻醉用0.025%～0.03%溶液，神经传导阻滞用0.1%

～0.3%溶液。腰麻时用10～15mg与脑脊液混合后注入。硬膜外麻醉用0.15%～0.3%溶液，与利多卡因合用时最高浓度

为0.3%。极量：浸润麻醉、神经传导阻滞，1次0.1g 注意事项 剂量可致心脏传导系统和中枢神经系统抑制。100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)