

西药麻醉用药：局部麻醉药辛可卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_E9\\_BA\\_BB\\_E9\\_c23\\_272678.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E9_BA_BB_E9_c23_272678.htm) 药物名称 辛可卡因

药物别名 地布卡因，沙夫卡因，纽白卡因，Sovcaine

，Dibucaine，Percaine，NUPERCAINE英文名称 Cinchocaine

说明 注射用辛可卡因：每支10mg。功用作用 在组织中远较普鲁卡因稳定，因此麻醉作用持续时间较长（约为普鲁卡因的3倍），适用于硬膜外麻醉以及腰麻。本品容易通过粘膜，也用于表面麻醉，但因其毒性过大（约比普鲁卡因高15倍），

较少用于浸润麻醉。用法用量 用法：硬膜外麻醉及腰麻

用0.2%～0.25%溶液，总剂量为7.5～12mg。表面麻醉用0.05%

～0.2%，浸润麻醉用0.01%～0.1%，在浸润麻醉时可与肾

上腺素合用，总剂量不得超过15mg。注意事项 本品别

名Percaine极易与Procaine相混，须特别留心，其毒性远较普

鲁卡因大，如误作普鲁卡因应用，必造成危险事故。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)