

西药麻醉用药：全身麻醉药泮库溴铵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_E9\\_BA\\_BB\\_E9\\_c23\\_272680.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E9_BA_BB_E9_c23_272680.htm) 药物名称 泮库溴铵  
药物别名 潘可罗宁，本可松，巴活朗PAVULON

，MYOBLOCK英文名称 Pancuronium Bromide说明 注射液：每支4mg（2ml）。功用作用 为较长效非去极化型肌松药。化学结构上属雄甾烷衍生物，但无雄激素样作用。其肌松作用类似筒箭毒碱，但强度要强5倍。静注后起效快，1分钟出现肌松，2~3分钟达高峰，持续约20~40分钟。在体内20%经肝代谢，40%由肾排出，40%由胆汁排泄。本品无神经节阻滞作用，不促进组胺释放。治疗剂量时对心血管系统影响较小，很少通过胎盘，对胎儿几无影响。较大剂量时可使心率加快，心收缩力减弱，外周阻力增加等。主要用作外科手术麻醉的辅助用药（气管插管和肌松）。用法用量 静注。成人常用量40~100 μg/kg；儿童常用量60~100 μg/kg。与乙醚、氟烷合用时应酌减剂量。注意事项 重症肌无力者禁用。肾功能不全者慎用。过量中毒时可静注新斯的明及阿托品解救。避光2~8 保存。有效期3年。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)