

中国药典2000版一部：小儿腹泻外敷散 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_272747.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_272747.htm) 【全文】

中药名称  
小儿腹泻外敷散拼音名Xiao ' er Fuxie Waifusan来源本品为吴茱萸、丁香、白胡椒、肉桂等药味经加工制成的散剂。鉴别  
(1) 取本品，置显微镜下观察：花粉粒三角形，直径约 $16\mu\text{m}$ 。非腺毛1~9细胞，胞腔内有时充满红棕色物。果皮石细胞类圆形或长圆形，黄色，直径 $15\sim 40\mu\text{m}$ ，壁厚，胞腔含棕色物。(2) 取本品1g，加乙醇10ml，超声处理20分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取吴茱萸对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取上述供试品溶液和对照药材溶液各 $2\mu\text{l}$ ，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水(5:1:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。检查应符合散剂项下有关的各项规定(附录 B)。功能与主治 温里散寒，燥湿健脾，止泻。用于胃肠虚寒性及消化不良性腹痛，腹泻。用法与用量外用。用食醋调成糊状，敷于腹部，二周岁以下，一次 $1/4$ 瓶，2岁以上，一次 $1/3$ 瓶。大便每日超过20次者，加敷涌泉穴，用量为 $1/4$ 瓶，每24小时换药一次。规格每瓶装5g贮藏密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)