

中国药典2000版一部：消瘦丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_272752.htm 【全文】中药名称消瘦丸拼音名Yiaoying Wan性状本品为褐色的大蜜丸；味咸涩。鉴别(1)取本品4丸，切碎，加硅藻土8g，研匀，加氯仿50ml、浓氨试液7.5ml，超声处理30分钟，滤过，滤液加稀盐酸10ml、水20ml，振摇，分取酸水层，加氨试液调pH值至8~9，用氯仿提取2次，每次10ml，合并氯仿提取液，蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取槟榔对照药材1g，加氯仿20ml及浓氨试液3ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述两种溶液各10 μ l，分别点于同一用1%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以苯-氯仿-甲醇(10:4:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(2)取本品12g，切碎，加硅藻土8g，研匀，加甲醇100ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇3ml使溶解，上清液作为供试品溶液。另取陈皮对照药材1g，加甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。再取橙皮甙对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述供试品溶液各2~4 μ l、对照药材溶液和对照品溶液各2 μ l，分别点于同一用0.5%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯-甲醇-水(100:17:13)为展开剂，展开约3cm，取出，吹干，再以1%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色

的荧光主斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。处方昆布 300g 海藻 200g 蛤壳 50g 浙贝母 50g 桔梗 100g 夏枯草 50g 陈皮 100g 槟榔 100g 制法 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜油110 ~ 130g制成大蜜丸，即得。检查 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 散结消瘿。用于瘰疬初起。用法与用量 口服，一次1丸，一日3次；饭前服用，小儿酌减。规格每丸重3g 贮藏密封。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com