

中国药典2000版一部：消栓通络片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_272756.htm 【全文】

中药名称消栓通络片拼音名Xiaoshuan Tongluo Pian性状本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色；气香，味微苦。鉴别(1)取本品粉末2g，加热升华，升华物加5%香草醛硫酸溶液2~3滴，显紫红色。(2)取本品粉末2.5g，加石油醚(60~90℃)5ml，密闭静置数小时，取上清液1ml，挥尽石油醚，残渣加甲醇1ml使溶解，再加二硝基苯甲酸试液4~5滴，氢氧化钾饱和的甲醇溶液2滴，显粉红色。(3)取本品4片，加乙醚10ml，振摇提取，滤过，残渣用水湿润，加以水饱和的正丁醇提取10ml，振摇提取10分钟，浸泡2小时，取上清液，残渣再加以水醇饱和的正丁醇10ml，振摇提取，取上清液与第一次提取的上清液合并，加以3倍量的正丁醇饱和的水，摇匀，放置使分层，取正丁醇层，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取人参皂甙Rb₁、Rg₁及三七皂甙R₁对照品，加甲醇制成每1ml各含2.5mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取供试品溶液5μl、对照品溶液10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-醋酸乙酯-水(4:1:5)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以硫酸乙醇(1:10)溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

处方川芎 120g 丹参 90g 黄芪 180g 泽泻 60g 三七60g 槐花30g 桂枝 60g 郁金 60g 木香 30g 冰片2.4g 山楂60g制法 以上十一味，冰片研细，三七粉碎成细粉；其余川芎等九味加水煎煮三次

，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至相对密度为1.35～1.40的清膏，加入三七细粉，烘干，制成颗粒，干燥，加入冰片细粉，混匀，压片，包糖衣，即得。检查应符合片剂项下有关的各项规定（附录 D）。功能与主治 活血化瘀，温经通络。用于血脂增高，脑血栓引起的精神呆滞，舌质发硬，言语迟涩，发音不清，手足发凉，活动疼痛。用法与用量口服，一次6片，一日3次。注意禁食生冷、辛辣、动物油脂食物。规格每片重约0.37g（相当于总药材1.8g）。贮藏密封。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com