

指甲受伤后的急救方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8C\\_87\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E6_8C_87_)

[E7\\_94\\_B2\\_E5\\_8F\\_97\\_E4\\_c67\\_273740.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E6_8C_87_E7_94_B2_E5_8F_97_E4_c67_273740.htm) 急救措施

1.指甲被挤掉时，最重要的是防止细菌感染。应急处理时，首先把挤掉指甲的手指，用纱布、绷带包扎固定，再用冷袋冷敷。然后把伤肢抬高，立即去医院。

2.指甲缝破裂出血，可用蜂蜜对一半温开水，搅匀，每天抹几次，就可逐渐治愈。

3.如果因外伤引起甲床下出血，血液未流出，使甲床根部隆起，疼痛难忍不能入睡时，可在近指甲根部用烧红的缝衣针扎一小孔

（但事前一定要彻底消毒），将积血排出，消毒后加压包扎指甲。

注意事项 1.手指甲被挤掉后，万一是夜间，不能去医院时，应对局部进行消毒，如家里有抗生素软膏，应涂上一层。第二天一定要去医院诊治。

2.平时不要把指甲剪得太“秃”，否则会造成指甲缝破裂出血。

3.有指甲破裂出血史的人，还应在日常的膳食中注意多吃些含维生素A比较多的食物，如白菜、萝卜、韭菜和猪肝等，以增加皮肤的弹性。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)