

中国药典2000版一部：七味葡萄散 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_274216.htm 【全文】中药名称七味葡萄散拼音名Qiwei Putao San来源本品系蒙古族验方。性状本品为黄棕色的粉末；气香，味甘、微涩。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：花冠碎片黄色，有红棕色或黄棕色分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。石细胞类方形或类圆形，壁一面菲细胞无色，椭圆形或类圆形，壁厚，孔沟细密。不规则片状结晶无色，有平直纹理。(2)取本品5g，加盐酸1ml,氯仿15ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取甘草次酸对照品，加无水乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液1~2 μl、对照品溶液2 μl，分别点于同一以羧甲基纤维钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60) - 苯 - 醋酸乙酯 - 冰醋酸(5:10:4:0.6)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%磷钼酸乙醇溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取本品5g，加乙醚20ml，振摇提取15分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取桂皮醛对照品，加无水乙醇制成每1ml含1 μl的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液10 μl、对照品溶液5 μl，分别点于同一以羧甲基纤维钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60) - 醋酸乙酯(17:3)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯肼乙醇试液。供试

品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方白葡萄干 180g 石膏 90g 红花 90g 甘草 90g 香附 60g 肉桂 60g 石榴 60g 制法以上七味，除白葡萄干外，其余石膏等六味粉碎成粗粉，加白葡萄干，粉碎，烘干，再粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。检查应符合散剂项下有关的各项规定（附录 B）。功能与主治清肺，止嗽，定喘。用于虚劳咳嗽，年老气喘，胸满郁闷。用法与用量口服，一次3g，一日1~2次。规格每袋装15g 贮藏密闭，防潮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com