

临床执业医师《内科学》辅导：常见肾小球疾病比较
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c67_274915.htm

1、肾炎综合征：以蛋白尿、血尿及高血压为特点的综合征，血尿为肾性血尿。分为急性肾炎综合征（急起，病程不到1年者）和急进性肾炎综合征（肾功能急性进行性恶化，于数月内发展为少尿或无尿的肾衰竭者）。2、肾病综合征：凡有大量蛋白尿（24h尿蛋白定量 $> 3.5g$ ）、高度水肿、高胆固醇血症（ $> 5.7mmol/L$ ）、低白蛋白血症（ $< 25g/L$ ）均可诊为肾病综合征。肾病综合征分为单纯性肾病和肾炎性肾病。3、肾炎性肾病和单纯性肾病：有低补体血症，镜下或肉眼血尿、氮质血症或高血压，学龄前儿童 $> 1610.6kPa$ （120/80mmHg），学龄 $> 17.3/12kPa$ （130/90mmHg），有以上一项或多项者属肾炎性肾病。无此上表现者为单纯性肾病。4、急性肾小球肾炎：急性起病，多有前期感染，以血尿为主，伴有不同程度的蛋白尿，可有水肿、高血压或肾功能不全，病程多在1年内。5、病毒性肾炎：病毒性肾炎可由乙肝病毒、丙肝病毒、EB病毒、巨细胞病毒、水痘病毒和流感病毒和一些尚不确切的呼吸道病毒等感染所致。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com