

支气管哮喘临床执业医师《内科学》辅导 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E6_94_AF_E6_B0_94_E7_AE_A1_E5_c67_275182.htm [概念] 支气管哮喘

(bronchial asthma ，简称哮喘) 是气道的一种慢性过反应炎症性疾病。它是由嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T淋巴细胞 (Th2) 等炎症细胞、气道上皮细胞和细胞组分参与的气道慢性过敏反应炎症性疾病。这种气道炎症导致气道高反应性

(airway hyperresponsiveness ， AHR) 的增加和广泛、易变的可逆性气流受限，表现为反复发作性喘息、胸闷和咳嗽症状。

[病理] 气道内以嗜酸性粒细胞浸润为主的过敏反应性炎症是支气管哮喘的主要病理特征。据此，有的病理学家将支气管哮喘称作慢性脱屑性嗜酸性粒细胞增多性支气管炎

(chronic desquamating eosinophilia bronchitis) 。 [问题] 诊断支气管哮喘的依据是 A. 血中嗜酸粒细胞增多 B. 有阻塞性通气功能障碍 C. 血清 IgE 升高 D. 反复发作性呼气性呼吸困难伴哮鸣音 E. 气道激发试验阳性 本题选 D. [解析] 支气管哮喘的诊断标准：

1. 反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽，多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关。

2. 发作时在双肺可闻及散在或弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音，吸气相延长。

3. 上述症状可经治疗缓解或自行缓解。

4. 除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽。

5. 临床表现不典型者 (如无明显喘息或体征) 至少应有下列三项中的一项： 支气管激发试验或运动试验阳性； 支气管舒张试验阳性； 昼夜 PEF 变异率大于等于 20% 。符合 1 ~ 4 条或 4、5 条者，可以诊断为支气管哮喘。 所以选 D 不选 E.

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com