

流行性腮腺炎临床执业医师《内科学》辅导 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E6_B5_81_E8_A1_8C_E6_80_A7_E8_c67_275187.htm [概念] 流行性腮腺炎

(mumps , epidemic parotitis) 简称腮腺炎或流腮，是儿童和青少年中常见的急性呼吸道传染病，近年成人患者也有所增加。本病由腮腺炎病毒引起，以唾液腺非化脓性肿胀疼痛为主要临床表现。病毒还可侵犯各种腺组织、神经系统、心、肝、肾和关节等器官，引起睾丸炎、胰腺炎和脑膜炎等并发症。 [症状] 潜伏期8~30天，平均18天。起病大多较急，无前驱症状。有发热、畏寒、头痛、咽痛、食欲不振、恶心、呕吐、全身疼痛等，数小时腮腺肿痛，逐渐明显，体温可达39

以上，成人患者一般较严重。腮腺肿胀最具特征性。一般以耳垂为中心，向前、后、下发展，状如梨形，边缘不清；局部皮肤紧张，发亮但不发红，触之坚韧有弹性，有轻触痛；言语、咀嚼（尤其进酸性饮食）时刺激唾液分泌，导致疼痛加剧；通常一侧腮腺肿胀后1~4天累及对侧，双侧肿胀者约占75%。颌下腺或舌下腺也可同时被累及。重症者腮腺周围组织高度水肿，使容貌变形，并可出现吞咽困难。腮腺管开口处早期可有红肿，挤压腮腺始终无脓性分泌物自开口处溢出。腮腺肿胀大多于1~3天到达高峰，持续4~5天逐渐消退而回复正常。全程约10~14天。颌下腺和舌下腺也可同时受累，或单独出现。颌下腺肿大，表现为颈前下颌肿胀并可触及肿大的腺体。舌下腺肿大可见舌及口腔底肿胀，并出现吞咽困难。 [问题] 腮腺在正常情况下摸不出，只有在下列疾病时（ ） A.流行性感
冒 B.流行性出血热 C.流行性腮腺炎 D.严

重的中耳炎 E.严重的乳突炎 本题选C. [解析] 正常腮腺体薄而软，触诊时摸不出腺体轮廓。腮腺肿大时可见到以耳垂为中心的隆起，并可触及边缘不明显的包块。腮腺肿大见于：1. 急性流行性腮腺炎 2. 急性化脓性腮腺炎 3. 腮腺肿瘤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com