

维生素AD属:阿法骨化醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/277/2021_2022__E7_BB_B4_E7_94_9F_E7_B4_A0A_c23_277756.htm 药物名称 阿法骨化醇

药物别名 英文名称 alfacalcidol说明 胶囊剂：每胶囊0.25 μg ；0.5 μg ；1.0 μg 功用作用 口服易吸收，在肝脏迅速代谢为1,25-(OH)₂D₃，8~24小时达高峰，大部由尿及粪便排出，t_{1/2}约2~4日。应用于慢性肾衰合并骨质疏松症、甲状旁腺功能低下及抗维生素d的佝偻病患者。用法用量 (1)慢性肾衰合并骨质疏松 成人：口服1次0.5~1.0 μg ，1日1次。(2)甲状旁腺功能低下和抗维生素d的佝偻病成人：口服1日1.0~4.0 μg 。注意事项 (1)治疗期间应定期测血钙，按血钙浓度调整剂量，如出现高血钙应停药。血钙降至正常浓度后应从低剂量重新开始。(2)高磷酸盐血症者应用氢氧化铝凝胶等控制血磷酸盐血症。(3)少数出现胃肠道反应、肝功能异常、精神和神经系统症状等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com