

维生素AD属：骨化三醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/277/2021_2022__E7_BB_B4_E7_94_9F_E7_B4_A0A_c23_277758.htm 药物名称 骨化三醇药
物别名 罗钙全，1，25-Dihydroxycholecalciferol，Rocaltrol英文
名称 Calcitriol说明 胶囊剂：每粒0.25 μg；0.5 μg。功用作用
作用同维生素D3。口服吸收快，3~6小时达高峰，t_{1/2}约3~6
小时，经7小时后尿钙浓度增加，单次口服剂量可持续药理活
性3~5日。应用于甲状旁腺功能低下症及血液透析患者的肾
性营养不良。用法用量 口服剂量应根据患者的血钙浓度来决
定。（1）血液透析患者的肾性营养不良 如患者血钙浓度正
常或略低，口服1日0.25 μg。如2~4周内生化指标及病情无明
显改变，则一日剂量可达到0.5 μg。每周应测两次血钙浓度，
随时调整剂量。大多数血透患者用量在1日0.5~1 μg。（2）
甲状旁腺功能低下 儿童1~5岁 1日0.25~0.75 μg，6岁以上和
成人，1日0.5~2 μg（用量须个体化）。注意事项（1）用药
过量可引起高血钙症，表现为眩晕、恶心、呕吐、腹痛、肌
无力、精神紊乱、烦渴、多尿、骨痛、肾结石、肾钙质沉着
，严重可导致心律不全等。（2）用药过程中应测血钙、磷
浓度，与高血钙相关的疾病忌用。（3）不能与维生素D类同
时应用。同时服用巴比妥类或苯妥英钠可加速本品代谢；考
来烯胺可减少本品吸收。100Test 下载频道开通，各类考试题
目直接下载。详细请访问 www.100test.com