

中国药典2000版一部：甘草流浸膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/283/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_283941.htm 中药名称甘草流浸膏拼音名Gancao Liujingao英文名EXTRACTUM

GLYCYRRHIZAE LIQUIDUM来源本品为甘草浸膏经加工制成的流浸膏。性状本品为棕色或红褐色的液体；味甜、略苦涩。鉴别取本品10ml，加稀盐酸，生成大量沉淀，滤过，沉淀用水洗涤，弃去洗液与滤液，沉淀再加氨试液使溶解，蒸干，残渣有甜味，溶于水后，强力振摇，产生持久性的泡沫。制法取甘草浸膏300~400g，加水适量，不断搅拌，并加热使溶化，滤过，在滤液中缓缓加入85%乙醇，随加随搅拌，直至溶液中含乙醇量达65%左右，静置过夜，仔细取出上清液，遗留沉淀再加65%的乙醇，充分搅拌，静置过夜，取出上清液，再用65%乙醇提取一次，合并3次提取液，滤过，回收乙醇，测定甘草酸含量后，加水与乙醇适量，使甘草酸和乙醇量均符合规定，加浓氨溶液适量调pH值，静置，使澄清，取出上清液，滤过，即得。检查pH值应为7.5~8.5（附录G）。乙醇量应为20~25%（附录M）。其他应符合流浸膏剂与浸膏剂项下有关的各项规定（附录O）。含量测定精密量取本品5ml置烧杯中，照甘草浸膏【含量测定】项下的方法，自“加氨试液3滴”起，依法测定，计算供试品中甘草酸的含量，即得。本品含甘草酸(C₄₂H₆₂O₁₆)不得少于7.0%。功能与主治【注意】同甘草浸膏。用法与用量口服，一次2~5ml，一日6~15ml。贮藏密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

