

口腔医师复习指导:妇女牙齿保健须知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/284/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_E8\\_85\\_94\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_284149.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/284/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E5_8C_BB_E5_c22_284149.htm) 由于女性和男性的生理差别，女性在治疗牙病时应注意以下几点：1、月经期不能拔牙。月经期的血液凝固性降低，拔牙后可能发生大出血。月经期身体抵抗力较低，拔牙后容易发生伤口感染。2、服用避孕药期间不能拔阻生牙。避孕药使口腔局部的抗感染能力下降，阻生牙又比较难拔。如果服用避孕药后拔阻生牙，50%以上的人会发生伤口感染。3、怀孕后头三个月和最后三个月不能拔牙。怀孕初期拔牙易诱发流产；怀孕晚期拔牙易发生早产。4、怀孕前应治疗牙病。据估计，80%的孕妇有牙疼、牙龈出血等牙科并发症。如果怀孕之前治疗牙病，怀孕期间就不会遭受牙病之苦了。5、青春期要注意保持口腔卫生。有一种牙周病称“青春期牙周炎”，主要发生于口腔卫生不良或有妇科病的女性。疾病发展迅速，容易引起牙齿松动，牙齿之间出现缝隙，影响美观。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)