

7个月大女婴怀孩子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022_7_E4_B8_AA_E6_9C_88_E5_A4_A7_c67_292192.htm 婷婷(化名)是名刚满七个月的女婴，但她的肚子却像孕妇一样鼓起一大块。几天前，医生从婷婷的肚子里取出一个“大肿块”。经过病理分析，医生认为婷婷肚子上的肿块是一个尚未完全发育的胎儿，医学称之为寄生胎，又叫胎中胎，发病机率为1/50万，非常罕见。据安徽省立医院儿外科专家介绍，婷婷是外地人，一个月前婷婷的父母在给她洗澡时发现其左侧腹部鼓起一个大包，于是到当地医院进行B超检查，发现婷婷的左腹膜后有一个大肿块，已经压迫到她的肠胃等内脏器官，由于孩子太小，医生建议他们带婷婷到合肥的大医院来手术。婷婷的父母带着她来到省立医院，经过CT检查，儿外科医生初步认定婷婷腹中的是畸胎瘤。几天前经过手术，医生取出婷婷肚子上的肿块，约有新生儿头颅大小，上面有一些毛发，肿块一侧还有一条像小胳膊一样的东西。手术后，婷婷腹中取出的肿块被送到医院病理科检验，检验结果让大家很吃惊，这个肿块居然是一个尚未完全发育的胎儿。省立医院病理科医生说婷婷腹中的肿块和畸胎瘤在外形上非常相似，但表面是正常的皮肤，检验中发现其带有肠管、肢芽、毛发，切开肢芽后里面还有未发育成熟的骨头，这些说明“肿块”其实是寄生胎，肢体发育成熟度较高。据悉，寄生胎是胚胎发育时被包入的胚胎，即一个胎儿寄生在另一个伴生的胎体内的不正常胚胎。其形成是同卵孪生时，分裂后的各个细胞团发育不均匀，其中占优势的一个将孪生兄弟(或姐妹)的胚胎吸入，包

囊在自己的体内，形成寄生胎。寄生胎的胚胎往往发育不全，四肢大小不等，或是缺肢，或者没有内脏，不可能存活，但寄生胎可以依靠宿主供给营养而生长。省立医院儿外科、病理科专家说，他们查阅了相关资料，国外医学文献有记载，寄生胎的发病机率为1/50万，非常罕见。2000年，省立医院曾在一个年满周岁的婴儿腹中发现寄生胎，此后一直未遇到此类病例。婷婷腹中的寄生胎，如果不及时手术取出，寄生胎会继续发育，并可能恶变。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com