

下半年婴儿对住院的反应及护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/293/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_8E\\_E5\\_8D\\_8A\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_c67\\_293584.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022__E5_90_8E_E5_8D_8A_E5_B9_B4_E5_c67_293584.htm) (1)

(1) 对住院的反应：婴儿在6个月时一般能辨认熟人和陌生人的面孔，认识自己的母亲，并对母亲越来越有着强烈的依赖性。此阶段的婴儿住院，主要反应是分离性焦虑（separation anxiety）即指婴儿跟他们的父母或最亲密的人分开所表现出来的行为特征。患儿哭闹不止，寻找母亲，避开和拒绝陌生人。如果住院时间较长，表现出不活泼、抑郁、退缩、对周围事物不感兴趣。

(2) 主要护理措施 护士首次接触患儿时，先和父母谈话，使患儿对护士有一个熟悉的过程，以消除或减少陌生心理，不要突然从父母怀抱中把患儿强迫抱过来，而增加患儿恐惧心理。 护士要尽量固定，连续护理，以满足患儿感情上及其他方面的需要。 了解患儿住院前的习惯，鼓励家长把患儿喜爱的玩具和物品带到医院，以减轻分离性焦虑，解除寂寞，满足其爱好，使之尽快适应住院生活。 保持与患儿父母的密切联系，做父母与患儿之间的桥梁。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)