

中国药典2000版一部：夏枯草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_293593.htm 【全文】中药名称夏枯草拼音名Xiakucao英文名SPICA PRUNELLAE来源本品为唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 的干燥果穗。夏季果穗呈棕红色时采收，除去杂质，晒干。性状本品呈棒状，略扁，长1.5~8cm，直径0.8~1.5cm。淡棕色至棕红色。全穗由数轮至10数轮宿萼与苞片组成，每轮有对生苞片2片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外表面有白毛。每一苞片内有花3朵，花冠多已脱落，宿萼二唇形，内有小坚果4枚，卵圆形，棕色，尖端有白色突起。体轻。气微，味淡。鉴别(1)项下的滤液少量，点于滤纸上，喷洒0.9%三氯化铁溶液与0.6%铁氰化钾溶液的等容混合液，即显蓝色斑点。(3)取本品粉末1g，加乙醇20ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，用石油醚(30~60℃)浸泡2次，每次15ml(约2分钟)，倾去石油醚液，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取熊果酸对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-氯仿-醋酸乙酯-冰醋酸(20:5:8:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，100℃加热至斑点清晰，分别置日光及紫外光灯(365nm)下检视，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，均显相同颜色的斑点。性味与归经辛、苦，寒。归肝、胆经。功能与主治清火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，瘰疬，乳痈肿痛

；甲状腺肿大，淋巴结结核，乳腺增生症，高血压症。用法与用量9～15g。贮藏置干燥处。【制剂】夏枯草膏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com