

中药炮制学习题及答案（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/294/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_82\\_AE\\_E5\\_c67\\_294100.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_82_AE_E5_c67_294100.htm) 第十章 炙法 习题一

一、填空题 1. 根据所用辅料的不同，炙法可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。2. 酒炙法多适用于\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、及\_\_\_\_\_药物。3. 酒炙法所用的酒以\_\_\_\_\_为主，酒的用量一般为\_\_\_\_\_。4. 姜炙法适用于\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的药物。5. 姜炙法生姜的用量一般为每100kg药物用生姜\_\_\_\_\_，若用干姜，其用量则为\_\_\_\_\_。6. 盐炙法盐的通常用量是每100kg药物，用食盐\_\_\_\_\_。溶化食盐的水量一般以食盐的\_\_\_\_\_倍为宜。7. 盐炙法多用于\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_和泻相火的药物。8. 目前常用白酒炮制的药物是\_\_\_\_\_。9. 2000版《中国药典》规定，知母含菝葜皂苷元不得少于\_\_\_\_\_；盐知母含菝葜皂苷元不得少于\_\_\_\_\_。10. 2000版《中国药典》规定，用75%乙醇作溶剂，杜仲浸出物不得少于\_\_\_\_\_；盐杜仲不得少于\_\_\_\_\_。11. 2000版《中国药典》规定，车前子酸不溶性灰分不得过\_\_\_\_\_，盐车前子不得过\_\_\_\_\_；照膨胀度项下的测定法测定，车前子膨胀度应不低于\_\_\_\_\_，盐车前子应不低于\_\_\_\_\_。12. 2000版（中国药典）规定，黄连总灰分不得过\_\_\_\_\_；酒黄连、姜黄连、萸黄连不得过\_\_\_\_\_。13. 制备清宁片每100kg大黄片或块，用黄酒\_\_\_\_\_，用炼蜜\_\_\_\_\_。14. 传统中药理论认为，当归不同部位作用不同，当归头\_\_\_\_\_，当归尾\_\_\_\_\_，当归身\_\_\_\_\_。15. 欲使莪术入肝经血分，增强其散瘀止痛作用

宜用\_\_\_\_\_。16. 炙没药常用的辅料是\_\_\_\_\_，用\_\_\_\_\_法进行操作。17. 延胡索的止痛成分主要是\_\_\_\_\_。18. 醋炙法常用的操作方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。19. 《中国药典》规定，京大戟的炮制方法为\_\_\_\_\_。20. 蜜炙法多用于\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的药物炮制。21. 生甘草性味是\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_；炙甘草性味是\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_。22. 生黄芪的主要作用是\_\_\_\_\_，蜜炙，黄芪的作用是\_\_\_\_\_。23. 马兜铃蜜炙后能\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，并可\_\_\_\_\_。24. 麻黄常用的炮制品有：\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_；其作用是\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_，其作用是\_\_\_\_\_。25. 桑白皮蜜炙后，可增强\_\_\_\_\_作用，多用于\_\_\_\_\_。26. 枇杷叶生用长于\_\_\_\_\_，多用于\_\_\_\_\_，炙后多用于\_\_\_\_\_。27. 紫菀蜜炙后\_\_\_\_\_，对\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的患者均可应用。28. 蜜炙药物的贮存均应\_\_\_\_\_，以免\_\_\_\_\_。29. 蜜炙马兜铃时，每100kg马兜铃用炼蜜\_\_\_\_\_。30. 油炙法的辅料为动、植物油脂，常用的有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、菜油、酥油。31. 羊脂炙淫羊藿的成品性状为表面\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，微有羊脂油气。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)