

中国药典2000版一部：香附 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_294419.htm 【全文】中药名称香附拼音名Xiangfu英文名RHIZOMA CYPERI来源本品为莎草科植物莎草Cyperus rotundus L. 的干燥根茎。秋季采挖，燎去毛须，置沸水中略煮或蒸透后晒干，或燎后直接晒干。性状本品多呈纺锤形，有的略弯曲，长2~3.5cm，直径0.5~1cm。表面棕褐色或黑褐色，有纵皱纹，并有6~10个略隆起的环节，节上有棕色的毛须，并残留根痕；去净毛须者较光滑，环节不明显。质硬，经蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；生晒者断面色白而显粉性，内皮层环纹明显，中柱色较深，点状维管束散在。气香，味微苦。鉴别(1)本品粉末浅棕色。分泌细胞类圆形，直径35~72 μm ，内含淡黄棕色至红棕色分泌物，其周围5~8个细胞作放射状环列。表皮细胞多角形，常常有下皮纤维束及厚壁细胞。下皮纤维成束，深棕色或红棕色，直径7~22 μm ，壁厚。厚壁细胞类方形、类圆形或形状不规则，壁稍厚，纹孔明显。石细胞少数，类方形、类圆形或类多角形，壁较厚。(2)取本品粉末1g，加乙醚5ml，放置1小时，时时振摇，滤过，滤液挥干，残渣加醋酸乙酯0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取 - 香附酮对照品，加醋酸乙酯制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取上述两种溶液各10 μl ，分别点于同一硅胶G F 254薄层板上，以苯-醋酸乙酯-冰醋酸(92:5:5)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显

相同的深蓝色斑点；喷以二硝基苯胍乙醇试液，放置片刻，斑点渐变为橙红色。炮制 香附 除去毛须及杂质，碾碎或切薄片。醋香附 取香附粒（片），照醋炙法（附录 D）炒干。检查 总灰分 不得过4.0%（附录 K）。性味与归经 辛、微苦、微甘，平。归肝、脾、三焦经。功能与主治 行气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、腕腹胀痛，消化不良，胸腕痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经。用法与用量6~9g。贮藏置阴凉干燥处，防蛀。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com