

中国药典2000版一部：活血止痛散 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/294/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_294787.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_294787.htm) 中药名称活血止痛散拼音名Huoxue Zhitong San性状本品为灰褐色的粉末；气香，味辛、苦、凉。鉴别(4)项下乙醚提取后的水残渣，挥尽乙醚，加甲醇30ml，超声处理15分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，移至分液漏斗中，加水饱和的正丁醇提取2次，每次15ml，合并正丁醇液，用水洗涤2次，每次10ml，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取三七对照药材1g，加甲醇30ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取上述两种溶液各2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-醋酸乙酯-水(4:1:5)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C烘数分钟。日光下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点；置紫外光灯(365nm)下检视，显相同颜色的荧光主斑点。处方当归 400g 三七 80g 乳香(制) 80g 冰片 20g 土鳖虫 200g 自然铜(煅)120g制法 以上六味，除冰片外，其余当归等五味粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。检查 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 B)。功能与主治 活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛。用法与用量 用温黄酒或温开水送服，一次1.5g，一日2次。注意 孕妇禁用。贮藏 密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)